

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
CAL-VET  
Injekcijska otopina  
Za upotrebu u veterinarstvu**

**SASTAV**

100 ml injekcijske otopine sadrži:

Kalcij glukonat	20 g
Kalcij glukoheptonata	4,5 g
Kalcij D-sakkarata	0,5 g
Magnezijum hlorida	3,4 g
Borne kiseline	4,3 g.

**OBLIK**

Injekcijska otopina

**INDIKACIJE**

Lijek se upotrebljava kod raznih uzroka hipokalcemije i to:

Porodajna groznica, mliječna tetanija, hipomagnezijski grčevi, transportna i pašna tetanija, rahitis, osteomalacija, hipokalcemija kod mladih životinja pri razvoju, pri smanjenju reproduktivnih sposobnosti, hematurija, alergije, trovanja hloroformom, organofosforim insekticidima, karbontetrahloridom, osobito živom, olovom, bakrom, kalajem, kadmijom i drugim metalima, kao i kod nervnih poremećaja, te morbus maculosus, serumske bolesti, anafilaksije, axantema hemoragične dijateze i dr.

**KONTRAINDIKACIJE**

Lijek se ne smije koristiti u slučajevima Hiperkalcemije, Hiperkalciurije i zatajenja srca.

**NEŽELJENI EFEKTI**

Nakon intravenozne primjene kalcija, nepravilan rad srca, bradikardija, blokada srca, mučnina ili povraćanje reakcije na mjestu primjene ili sl. su reakcije koje se mogu pojaviti prilikom tretiranja. Međutim kod intramuskularne i potkožne aplikacije nuspojave je vrlo rijetke.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

**DOZIRANJE I PRIMJENA**

Ne tretirati osim ako nije preporučio veterinar.

Tabela doziranja:

Govedo	(250-500 kg žive vage)	250-500 ml
Konj	(250-500 kg žive vage)	100-250 ml
Ovca, Koza	(25-50 kg žive vage)	50-150 ml
Pas	(3-25 kg žive vage)	3-25 ml

**KARENCIJA:**

Meso, organi i mlijeko: „ 0“ dana.

**UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA**

Rok trajanja je 3 god od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C )

**SIMPTOMI PREDOZIRANJA I MJERE OPREZA**

Soli kalcijuma su otrovni za srce. U intravenoznom tretiranju treba kontinuirano pratiti rad srca . Treba pratiti otkucaje srca i prekinuti doziranje ako je puls u porastu. Ako je u pitanju trovanje kalcijumom pripremiti otopinu od 10 % magnezijum sulfata od 300 ml. (za krave normalne veličine), dozirati venski i spriječiti trovanje.

**MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU**

Izbjegavajte kontakt sa lijekom, nakon upotrebe isprati ruke.

**SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKÉ PROIZVODE ILI OTPADNI  
MATERIJAL**

Svaki neiskorišten veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

**PRIMJENA LIJEKA:** Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

**PAKOVANJE**

Bočica od 100, 250 i 500 ml u kartonskoj kutiji (setovi).

**PROIZVOĐAČ**

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

Datum odobrenja prospekta: 29.09.2004

**MINİSTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNIH POSLOVA REPUBLIKA TURSKA**

**BROJ I DATUM LICENCE: 10.08.1990-7/607**

**UVOZNIK ZA BiH**

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 035/819-523

**BROJ I DATUM RJEŠENJA:**

UP-I-06-2-20/21-431/21 J.B. od 07.05.2021.