

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU LIJEKA**

### **PINOX 1250mg**

*comprettae spumescentes*  
oblete za intrauterinu primjenu  
Samo za upotrebu u veterinarstvu

## **PINOX 1250mg**

*comprettae spumescentes*

oblete za intrauterinu primjenu

Samo za upotrebu u veterinarstvu

Jedna kompreta/ obleta sadrži:

### **Aktivna supstanca:**

Oxytetracyclin hydrochloride 1250,0 mg

### **Pomoćna sredstva:**

Sodium bikarbonat (Natrii hydrogencarbonas)

Celluose microcrystalline

Limunska kiselina (Acidum citricum anhydricum)

Magnezijum stearat (Magnesii stearas)

Sodium laurylsulphate (Natrii laurilsulfas)

### **Indikacije:**

Lijek je namjenjen za intrauterino liječenje akutnog puerperalnog endometritisa, zaostajanja posteljice (*retentio secundinarum*), fetomije, porođaja carskim rezom, kao i kod prevencije inflamatornih procesa (endometritis i piometra) odmah nakon porođaja prouzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na oksitetraciklin.

Oksitetraciklin ima bakteriostatički učinak koji se manifestuje inhibiranjem proteinske sinteze u ribozomima bakterija. Djeluje na Gram negativne mikroorganizme (*Enterobacterium spp*, *Pasteurella spp*, *Bordetella spp*, *Hamophilus spp*, *Moraxiella spp*, *Branhamella spp*, *Brucella spp* i td), Gran pozitivne (aerobni cocci, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Listeria spp* i td), sporulirajuće anaerobe, ali i one koji ne sporuliraju (*Clostridium spp*, neke vrste *Bacteroides spp*, *Fusobacterium necrophorum*, *Peptostreptococcus spp*), kao i mikoplazme, rikecije i hlamidiye. Lijek ima i antiprotozoarno djelovanje, ali nema učinka na *Pseudomonas aeruginosa* i većinu vrsta iz grupe *Proteus spp*, *Providentia spp*, *Morganella spp*, i neke vrste *Bacteroides spp*."

### **Kontraindikacije:**

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na aktivnu supstancu ili druge tetracikline.

### **Neželjene reakcije:**

Nisu poznate

Rizik od sporednih efekata je neznatan zbog specifične metode administracije (intrauterina) i sigurnosnog profila proizvoda.

### **Ciljane vrste**

(goveda ) krave, (konji) kobile, magarice, ovce, koze i (svinje) krmače.

### **Doziranje za svaku vrstu, nacin i metode administracije.**

Koristi se u intrauterinim prenosom kroz cerviks.

### **Doziranje za liječenje:**

Krave, kobile, magarice: 1-2 komprete/ oblete svaka 24 sata tokom 3-5 dana.

Ovce, koze, svinje: 1 kompreta/ obleta svaka 24 sata tokom 3-5 dana.

### **Doziranje kao prevencija:**

Krave, kobile, magarice: 1-2 komprete

Ovce, koze, svinje: 1 kompreta

Profilaktični tretman bi trebao biti izvršen odmah nakon porođaja i ponovljen ako je potrebno nakon 24 sata. U slučaju septikemije i generalne infekcije , uporedo sa kompretama/ obletama trebalo bi prepisati i odgovarajući tretman putem sistemskog uvođenja odgovarajućih antiupalnih sredstava.

### **Savjet o ispravnoj administraciji:**

Koristi se intrauterino prenosno kroz cervix. U slučaju suhoće uterusa 300ml izotoničnog rastvora NaCl zagrjanog na 38°C bi trebalo unijeti zajedno sa apliciranim kompretom/ obletom.

### **Karenca:**

Goveda (krave), konji (kobile, magarice), ovce, koze, svinje (krmače)

Meso i iznutrice (za ljudsku ishranu) najmanje 60 sati nakon posljednjeg tretmana

Mlijeko (za ljudsku ishranu) najmanje 72 sata (6 muža) od posljednjeg tretmana

Meso životinja koje su uginule ili su hitno zaklane tokom tretmana ne bi trebalo koristiti za ljudsku ishranu.

Nije dozvoljeno korištenje mlijeka tokom terapije najmanje 72 sata nakon tretmana kod mlječnih životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

### **Specijalna upozorenja za skladistenje:**

Držati dalje od dosega djece . Čuvati na temperaturi do 25°C

Čuvati u originalnom pakovanju. Zaštiti od direktnih sunčevih zraka.

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja naznačenog na pakiranju.

Čuvati na suhom mjestu.

### **Specijalna upozorenja**

#### **Specijalna upozorenja za svaku ciljanu životinju**

Nema ih.

**Specijalne mjere opreza za korištenje na životinjama**

Korištenje ovog preparata treba biti u skladu sa zahtjevima nadležnih i lokalnih propisa za upotrebu antibiotika. Neplanirana zloupotreba proizvoda kao i nekontrolisano korištenje kada se ne slijede instrukcije navedene u sažetku karakteristika proizvoda mogu dovesti do povećane bakterijske otpornosti na tetracikline i stoga smanjiti efikasnost tretmana liječenja. Ukoliko je potrebno koristiti lubrikant posebno kod malih preživara / ovaca i koza/ i svinje. Koristiti u slučajevima otvorenosti cervixa.

**Specijalna upozorenja koja trebaju poštovati osobe koje administriraju veterinarski proizvod životinjama:** Osobe sa poznatom osjetljivošću na oxytetracikline trebaju izbjegavati kontakt sa veterinarsko medicinskim proizvodom. Zaštitna oprema koja se sastoji od hirurških rukavica bi trebala da se koristi prilikom upotrebe veterinarsko medicinskog proizvoda. Oprati ruke nakon administracije proizvoda. Ne jesti, piti ili pušiti prilikom davanja proizvoda.

**Koristenje tokom graviditeta, laktacije**

Gravidnost: proizvod se može koristiti tokom cijelog perioda graviditeta.

Laktacija: nije dozvoljeno koristenje kod mlječnih životinja čije je mlijeko namjenjeno za ljudsku ishranu.

**Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima interakcije:**

Davanje oxytetraciklina može dovesti do pojave dvovalentnih ili trovalentnih kationa koji mogu smanjiti absorpciju tetraciklina ili drugih lijekova u prisustvu ovih kationa.

**Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nepredviđenih situacija, protuotrovi) u slučaju potrebe**

Rizik od predoziranja je zanemariv zbog specifickog metoda davanja (intrauterina) i sigurnosnog profila proizvoda.

**Inkompatibilnost**

Nije poznata

**Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal, ako ih ima :**

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Pinox 1250mg komprete/ oblete ne bi trebalo odlagati u vodotokovima jer može biti opasno za ribe i druge vodene organizme.

Pinox 1250mg komprete/ oblete ne bi trebalo odlagati sa vodom za domaćinstva.

Pitajte svog veterinara kako odlagati proizvod koji više nije u upotrebi. Ove mjere bi trebale pomoći zaštiti okoliša.

**Datum zadnjeg odobrenja uputstva proizvoda:**

16 septembar 2014

**Pakovanje :**

Plastični kontejner hermetički zatvoren sa trakastom termofolijom i plastičnim zatvaračem sadrži 40 aluminijskih folijskih blistera koji sadrži 1 kompretu (obletu)

**Način izdavanja:** na recept

**Proizvodač:** Golashpharma Ltd Bulgaria , Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Konstendil, Bugarska.  
tel:+359 888 300 755

**Uvoznik za BiH:**

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica , Bosna i Hercegovina  
tel: 032/423-196; fax: 032/423-194

**Broj i datum odobrenja:** UP-I-06-2-24/17-957/15 J.B. od 26.10.2015.