

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PRİMAFUL

İnjekcijska Solucija

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml injekcijske solucije sadrži:

Oksitetraciklin dihidrata	300 mg
Fluniksin (u obliku meglumina)	20 mg

OBLIK

Injekcijska solucija

INDIKACIJE

Lijek se upotrebljava samo u goveda i svinja kod pojave infekcija (sistemske i lokalne) i dišnom i uro – genitalnom traktu, kao i sekundarne bakterijske infekcije. Bakterija *Pasteurella haemolytica* koja uzrokuje infekcije disajnih puteva je posebno osjetljiva na preparat.

KONTRAINDIKACIJE

Ne tretirati intravenozno.

Tretiraju se samo goveda i svinje, ne tretirati ovce, koze, konje, pse i mačke.

Životinje osjetljiva na tetraciklin se ne tretiraju, posebno životinje s osjetljivom jetrom i bubrežima.

Ne tretirati životinje koje nisu u potpunosti izašle iz anestezije.

Ne tretirati životinje koje su mladje od 6 sedmica i ne tretirati stare životinje, ako je pak potrebno onda sa manjom dozom i pažljivo.

Ne tretirati životinje koje su u dehidraciji ili koje su osjetljive ili ako postoji rizik od bubrežne toksičnosti.

Unutar 24 sata nakon primjene, ne treba primjenjivati druge ne-narkotike protiv bolova.

Nemojte koristiti sa drugim nefrotoksičnim lijekovima.

Dugotrajna upotreba ovog lijeka može prouzrokovati gastrointestinalne iritacije ili ulceraciju.

Upotreba u gestaciji: Ne smije se upotrebljavati u gestaciji.

NEŽELJENI EFEKTI

Tretiraje u velikim dozama u periodu gestacije može uzrokovati diskolaraciju na kostima i zubima fetusa. Ima isto dejstvo također kod mlađih životinja. Dugotrajno tretiraje u visokim dozama može izazvati oštećenja jetre ili masne degeneracije jetre kod životinja u gestaciji. Također može izazvati tetraciličnu osjetljivost, alergiju ili lokalnu reakciju na mjestu primjene. Nakon injekcije kod goveda može izazvati prolazni hemoglobinuri ili tamniju mokraću. Brzo intravensko tretiranje tetraciklinom može izazvati kardiovaskularni kolaps kod svih vrsta.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne preporučuje se tretiranje nikom osim doktoru veterinarske medicine;

Koristi se samo kod goveda i svinja.

Farmakološka doza: 30 mg/kg/žive vase (oksitetraciklin) i 2 mg/kg/žive vase (fluniksin).

Pratična doza: duboko intramuskularno, u dozi od 1ml/10 kg. Primjenjuje se jedna doza.

Protiv upalni učinci 24-36 sati, antibakterijski traju od 5 do 6 dana.

Više od 15 ml lijeka ne treba primijeniti na jednom ubodnom mjestu, ako se primjenjuje onda dijeljenjem ukupnog iznosa treba ubrizgati na odvojenim mjestima. U tretiranju treba primjenjivati asepsu i antisepsu.

KARENCIJA:

Meso i organi goveda: 35 dana.

Meso i organi svinja: 21 dan,

Ne primjenjuje se kod goveda čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 2 godine od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C).

Nakom prve upotrebe ,ako se čuva u kartonskoj kutiji i u preporučenim uvjetima , može se koristit u roku od 28 dana.

SIMPTOMI PREDZIRANJA I MJERE OPREZA

Nisu poznati.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Izbjegavajte kontakt s lijekom , i oprati ruke nakon upotrebe.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

Tamnabоčica od 20, 50 i 100 ml u kartonskoj kutiji.

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

DATUM ODOBRENJE PROSPEKTA: 24.06.2004

MINISTARSTVO HRANE,POLJOPRIVREDE I UZGOJA ŽIVOTINJA REPUBLIKA TURSKA BROJ I DATUM LICENCE:
04.07.2002-11/1070

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina Tel/fax: 035/819-523

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-48/19 od 20.03.2019.godine