

## Uputstvo za upotrebu

**Bovilis BVD**, inaktivna suspenzija za injekciju u bočici od jedne doze od 2 ml ili višedoznoj bočici od 10/20/50/100 ili 250 ml.

(za primjenu u veterinarstvu)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnositelj zahtjeva: Intervet International bv, Predstavništvo za BiH

Adresa: Tešanjska 24 A, Sarajevo

**IME LIJEKA**

Bovilis BVD

**KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

Doza od 2 ml sadrži:

Aktivna tvar: Inaktivirani antigen citopatogenog BVD virusa, soj C-86, 50 Elisa jedinica (EU), koji inducira najmanje 4.6 log<sub>2</sub>VN jedinica

Adjuvans: Al3+ (u obliku Al-fosfata i Al-hidroksida) 6-9 mg

Konzervans: Metil parahidroksibenzoat 3 mg

Tragovi antibiotika i telećeg seruma kao ostataka od proizvodnje antiga.

**INDIKACIJE ZA UPOTREBU**

Bovilis BVD je inaktivirana vakcina za aktivnu imunizaciju goveda protiv fetalne infekcije virusom goveđe dijareje (BVDV).

Bovilis® BVD sadrži imunogeni soj citopatogenog virusa BVD. Soj virusa se uzgaja u ćelijskim kulturama. Nakon inaktivacije, antigen se adsorbuje na aluminijumske soli kako bi se postigla produžena stimulacija imunog sistema.

**CILJNA VRSTA**

Goveda u dobi 8 mjeseci i stariji.

**KONTRAINDIKACIJE**

Nisu primijećene

**NUSPOJAVE**

Jedva oplijivo oteknuće na mjestu aplikacije, u trajanju od 14 dana nakon ubrizgavanja.

U slučaju pojava ozbilnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koii se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

**DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE**

Svakoj životinji treba dati 2 ml vakcine intramuskularnom injekcijom.

**Preporučeni program vakcinacije**

Bovilis BVD treba dati govedima u dobi od osam mjeseci i starijima. Za primarnu vakcinaciju, životnjama treba dati jednu dozu (2 ml) otprilike 2 mjeseca prije prve steonosti, a zatim izvršiti dovakcinaciju (2 ml) 4 sedmice kasnije. Preporučuje se revakcinacija jednom dozom (2 ml), otprilike 4 sedmice prije svake naredne steonosti.

U slučaju ekstenzivnog stočarstva, preporučuje se alternativni program vakcinacije. Prva doza vakcine Bovilis BVD (2 ml) primjenjuje se na svim govedima starijim od 8 mjeseci, nakon čega se 4 sedmice kasnije vrši dovakcinacija. Nakon ovih primarnih vakcinacija, sve životinje na farmi se revakcinišu nakon 6 mjeseci, a naredna revakcinacija je u intervalu ne većem od 12 mjeseci.

**NAPOMENA**

Kod zdravih životinja neće se javiti nikakve kliničke reakcije na vakcinaciju. Može se osjetiti blago oteknuće na mjestu vakcinacije u trajanju od 1 do 2 sedmice.

Vakcinisati samo zdrava goveda. Prije upotrebe pustiti da se vakcina izjednači sa sobnom temperaturom (15-25°C). Prije upotrebe dobro protresti bočicu. Koristiti sterilnu opremu za ubrizgavanje. Ne mijesati sa drugim vakcinama.

**KARENCA**

0 dana.

**POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Čuvati od 2 do 8°C. Ne zamrzavati. Držati van dohvata djece.

**POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA**

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpada ("Službene novine Fedracije BiH" broj 33/03).

**BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-20/21-1200/20 J.B; od 15. oktobra 2020 godine

**Pakovanje:** Bočica od jedne doze od 2 ml ili višedozna bočica od 10/20/50/100 ili 250 ml od stakla.

**Način izdavanja:** Na veterinarski recept.

**Rok upotrebe:** 24 mjeseca.

**ATC vet kod:** QI02AA01

**NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LIJEKA**

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanska 24 A, Sarajevo