

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

KALSİMİN

Injekcijska Otopina

Za upotrebu u veterini

SASTAV

100 ml injekcijske otopine sadrži:

Kalcijum glukonata	45 g
Kalcijum glukoheptonata	2 g
Kalcijum hipofosfita	2 g
Kalcijum D-sakkarata	1 g
Magnezijum hlorida	3 g

OBLIK

Injekcijska otopina

INDIKACIJE

Lijek se upotrebljava kod raznih uzroka hipokalcemije i to:

Porođajna groznica, mlijecna tetanija, hipomagnezijski grčevi, transportna i pašna tetanija, rahič, osteomalacija, hipokalcemija kod mladih životinja pri razvoju, pri smanjenju reproduktivnih sposobnosti, hematurija, alergije, trovanja hloroformom, organofosfornim insekticidima, karbontetrahloridom, osobito životom, olovom, bakrom, kalajem, kadmijom i drugim metalima, kao i kod nervnih poremećaja, te morbus maculosus, serumske bolesti, anafilaksije, exantema hemoragične dijateze i dr.

KONTRAINDIKACIJE

Ne smije se koristiti u slučaju zatajenja srca, hiperkalcemije i hiperkalciurije.

NEŽELJENI EFEKTI

Nakon intravenozne primjene kalcija, nepravilnost u radu srca, bradikardija, blokada srca, mučnina, povraćanje i promjene na mjestu tretiranja su moguće pojave. Međutim, kod intramuskularnog i potkožnog apliciranja nuspojave su veoma rijetke.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne tretirati osim ako nije preporučio veterinar.

Tabela doziranja:

Goveda	(200-500 kg žive vase)	80-100 ml
Konj	(200-500 kg žive vase)	80-100 ml
Ovca, Koza	(25-50 kg žive vase)	15-25 ml
Svinja	(50 kg žive vase)	15ml

Primjenjuje/tretira se: Intravenozno, intramuskularno i subkutano

Kalsimin Injekciona Otopina se tretira intravenozno sporim tempom, subkutane i intramuskularne aplikacije se vrše u 3-4 podijeljene doze.

KARENCIJA:

Mlijeko i meso: "0" dana.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 3 god od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C).

SIMPTOMI PREDZIRANJA I MJERE OPREZA

Soli Kalcijuma su otrovi za srce. Kod intravenoznog davanja treba pratiti rad srca. U slučaju povećanja rada otkucaja srca treba prekinuti sa terapijom. Ako je riječ o trovanju kalcijumom tretirati sa 10% magnezijum sulfatske otopine (300 ml) (kod normalne veličine goveda), intravenoznim tretiranjem se sprečava trovanje.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Izbjegavajte kontakt sa lijekom, nakon upotrebe isprati ruke.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEUBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

Bezbojne bočice od 50, 100 i 250 ml.

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.
Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA
Tel: 03128271840

DATUM ODOBRENJE PROSPEKTA: 29.09.2004

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNIH POSLOVA REPUBLIKA TURSKA BROJ I DATUM LICENCE:
17.10.1995-8/736

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: 035/819-523

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-20/21-439/21 od 07.05.2021.godine