

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MASTIKOL - DC

Intramamarna suspenzija

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 injektor (5g) sadrži:

Ampicilina (u obliku ampicilin trihidrata)	250 mg
Kloksacilina (u obliku kloksacilin benzatina)	500 mg

OBLIK

Intramamarna suspenzija

INDIKACIJE

Primjenjuje se kod muznih krava u suhostaju, radi zaštite od infekcija koje se javljaju u suhostaju i pri tretiranju mastitisa nakon posljednje muže tokom laktacije. Primjenjuje se za smanjenje pojave mastitisa u ljetnom periodu. Antibakterijsko dejstvo sa ovim lijekom može trajati oko 28 dana u mamarnom tkivu.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek je kontraindikativan za životinje osjetljive na penicilin.

NEŽELJENI EFEKTI

Najznačajnije nuspojave penicilina su anafilaksa (povećana osjetljivost organizma) i kolaps. Ovrh toga, može doći do manje ozbiljnih ali učestalijih reakcija poput preosjetljivosti (urtikarija, groznica, angioneurotski edem itd). U slučaju anafilakse treba primijeniti eninefrin i/ili kisik i intravenozno steroid.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne preporučuje se osim po preporuci veterinara.

Sadržaj jedne tube se nanosi na svaki mamarni dio vimena preko mamarnog kanala nakon poslednjeg muženja tokom perioda laktacije. Prije primjene lijeka potrebno je izmesti mlijeko iz mamarnog dijela vimena. Radi uništavanja zaraznih mikroorganizama potrebno je detaljno čišćenje bradavica i ruku. Potom se ukloni vrh kanile i pažljivo se umetne u mamarni otvor, ali se kanila ne treba gurati u mamarni kanal. Nakon pražnjenja sadržaja tube bradavice treba tretirati prstima i mamarni dio vimena nježno masirati dlanom čime sadržaj lijeka zasigurno dopre do mamarnog tkiva. Nakon primjene lijeka potrebno je obrisati bradavice antiseptičkim maramicama. Antibakterijsko dejstvo unutar mamarnog tkiva traje oko 28 dana nakon primjene lijeka.

KARENCIJA:

Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 28 dana.

Mlijeko: 49 dana + 96 sati. Ukoliko se krava oteli prije 49-tog dana nakon primjene VMP, tada do korištenja mlijeka također treba proteći 56 dana od aplikacije. U izrazito hipokalcemičnih krava ponekad je nužno „vrijeme čekanja“ produžiti na više od 56 dana. U takvim okolnostima mlijeko se smije koristiti tek kad se utvrdi da su rezidue antibiotika manje od najvećih dopuštenih koncentracija (kloksaciklin <30 µg/kg; ampicilin < 4 µg/kg).

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 2 godine od datuma proizvodnje.

Zaštititi od svjetlosti.

Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25 °C)

SIMPTOMI PREDORIZANJA I MJERE OPREZA

U slučaju anafilakse nastale uslijed predoziranja ili osjetljivosti prekinuti upotrebu i ako je moguće primijeniti adrenalin, steroid i kisik prema kliničkim uputama.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Osobe osjetljive na penicilin ni u kom slučaju ne smiju doći u kontakt sa lijekom. Izlaganje osjetljivih osoba prilikom kontakta lijeka sa usnom dupljom. Kožom ili prilikom udisaja uzrokuje oticanje lica, očiju ili usana i

poteškoće kod disanja što zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju. U tom slučaju treba kontaktirati ljekara i pokazati istom lijek i prospekt kojeg treba držati kod sebe. Nakon primjene lijeka dobro oprati ruke.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

Kutije sa 24 injektora i pojedinačna pakovanja injektora u kesicama (injektor = 5 g).

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

DATUM ODOBRENJA PROSPEKTA: 24.06.2004.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I STOČARSTVA REPUBLIKA TURSKA BROJ I DATUM LICENCE:

17.07.1995. – 8/730

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina Tel/fax: 035/819-523

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-20/21-434/21 od 07.05.2021.godine