

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
MASTIVIL
Intramamarna suspenzija
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 injektor (5 g intramamarne suspenzije) sadrži:
Prokain Penicilina G.....: 100.000 i.j.
Streptomycin sulfat.....: 100 mg
Neomicin sulfat.....: 100 mg
Prednizolon.....: 10 mg

OBLIK

Injekcijska otopina

INDIKACIJE

Lijek je antibiotik širokog spektra djelovanja, namijenjen za liječenje kliničkog mastitisa kod mliječnih krava u laktaciji. Koristi se protiv bakterija osjetljivih na penicilin, streptomycin i neomicin, a to su: Streptococcus spp, Staphylococcus spp, E. coli, Klebsiella pneumoniae i dr. Također lijek ublažava bolove i lokalni upalni proces.

KONTRAINDIKACIJE

Mogu se vidjeti alergijske reakcije različitih supnjeva kod životinja koje su osjetljive na penicilin. Ne treba primjenjivati kod životinja koje su osjetljive na penicilin i druge aktivne materije.

NEŽELJENI EFEKTI

Najvažnije nuspojave penicilina su akutna anafilaksija i kolaps. Također, manje nasilne ali češće reakcije su pojave: urtikarija, groznica, angioneurotski edem. Ako se pojavi anafilaksija u tom slučaju treba upotrijebiti epinefrin i/ili oksigen, odnosno I.V steroide.

Također se mogu pojaviti faktori osjetljivosti na lijek kao što su uretici i promjene na koži.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne tretirati osim ako nije preporučio veterinar;

Tretira se intramamarno, jednu tubu na jednu četvrt vimena. Prije tretiranja lijeka potrebno je predhodno izmisti mlijeko iz određenog dijela vimena. Antisepsija se postiže čišćenjem vimena i ruku. Poslije se skida poklopac kanile. Mastivil Intramamarna suspenzija, kanilu pažljivo ubrizgamo u četvrt vimena te ispraznimo tubu. Zatim se umjerenom masažom vimena izmasira tkivo vimena da bi se sadržaj lijeka rasprostranio u oboljenom mjestu. Zatim je potrebno bradavice i vime ponovno očistiti s antiseptičkim maramicama. Liječenje ponoviti na svakih 24 sata sledeća tri dana. Ako je potrebno aplicirati i sa sustavnim antibioticima. 6 sati nakon tretiranja vime izmusti.

KARENCIJA:

Meso i organi: 10 dana, Mlijeko: 5 dana (10 muža).

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 2 god od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti na sobnoj temperaturi od 15-25 °C.

SIMPTOMI PREDOZIRANJA I MJERE OPREZA

Kod predoziranja prema anafilaktičkoj tabeli , prekinuti terapiju, koristiti adrenalin, steroid i po potrebi oksigen.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Osobe osjetljive na penicilin nebi trebale nikako da dolaze u dodir sa lijekom. Kod osjetljivih osoba na penicilin prilikom gutanja lijeka, dodira sa kožom ili udisanjem, kod pojave oteklina lica, očiju ili usana, pojave otežanog disanja ili takvih simptoma trebaju hitno potražiti liječničku pomoć. Kod tih slučajeva ponijeti sa sobom lijek i prospekt na uvid ljekaru. Nakon upotrebe operite ruke.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKÉ PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorištení veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

24 injektora (5 g) u kartonskoj kutiji.

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

DATUM ODOBRENJE PROSPEKTA: 12.06.2006

MINİSTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNIH POSLOVA REPUBLIKA TURSKA BROJ I DATUM LICENCE:

12.06.2006-16/024

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina Tel/fax: 035/819-523

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-24/17-50-1/19 od 02.12.2021.godine