

Uputstvo za upotrebu

Nobilis AE + Pox, živa suho-smrznuta vakcina od 1000 doza i Unisol otapalom sa aplikatorom

(za primjenu u veterinarstvu)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnositelj zahtjeva: Intervet International bv, Predstavništvo za BiH

Adresa: Tešanjska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

Nobilis AE + Pox

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nobilis AE+Pox je smrznuta-suha vakcina. Svaka doza sadrži $\geq 2.5 \log_{10}$ EID₅₀ živog virusa avijarnog encefalomijelitisa, soj 1143 (Calnek) i $\geq 2.8 \log_{10}$ EID₅₀ živog virusa boginja peradi, soj Gibbs, ugojenog na SPF kokošijeg jajeta. Vakcina sadrži stabilizatore i gentamicin sulfat. Pakovano je u dvije odvojene jedinice. Jedna sadrži živu vakcinu i druga sadrži bocu sa sterilnim rastvaračem (UNISOL).

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Aktivna imunizacija podmlatka konzumnih i rasplodnih nesilica, te purana protiv avijarnog encefalomielitisa (epidemički tremor) i boginja peradi.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

CILJANA VRSTA

Kokoši i purani.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Rekonstruisati 1000 doza vakcine sa 10 ml rastvarača neposredno prije upotrebe. Aplikator se treba uroniti u vakcinsku i onda ubesti ispod krila. Pernati dijelovi krila se trebaju izbjegavati.

Nakon 7-10 dana nakon vakcinacije, nekoliko jedinki treba ispitati na podnošenje vakcine. Zadovoljavajući učinak je blago oticanje na mjestu uboda i formiranje krastice koja otpadne 2-3 nedjelje nakon vakcinacije.

Vakcinalni program

Kokoši se vakcinišu u dobi između 8 i 16 sedmica starosti.

Ćurke se vakcinišu u periodu od 18 i 26 sedmice starosti.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU

Vakcinisati samo zdrave životinje. Iako oboljenje ne mora biti izraženo, kokcidioza te infekcije Mikoplazmom, Marekovo oboljenje i druga bolesna stanja mogu uzrokovati komplikacije ili smanjen razvoj imuniteta.

Sve potencijalne kokoši sa istim svojstvima bi se trebale vakcinisati u isto vrijeme.

Ne koristiti manje od jedne doze po ptici.

Ne vakcinisati unutar 4 sedmice prije početka nešenja jaja.

Ne vakcinisati kokoši mlađe od 8 sedmica i čurke mlađe od 18 sedmica.

KARENCA

„0“ dana. Ne vakcinisati unutar 4 sedmice prije početka nešenja i tokom nesivosti.

POSEBNO UPOZORENJE ZA ČUVANJE PREPARATA

Smrznuta-suha vakcina bi se trebala čuvati na temperaturi od 2 do 8°C, u tami.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA I OSTATAKA LIJEKA

Ostaci lijeka ili pakovanja uništavaju se u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Sl.novine Federacije BiH, broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-748/18 J.B. od 18.06.2018. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje: Boćice od 1000 doza i Unisol otapalo sa aplikatorom.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 24 mjeseca. Sadržaj otvorene boćice treba utrošiti unutar 2 sata od rekonstruisanja.

ATC vet kod: QI01AD**

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LIJEKA

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanjska 24 A, Sarajevo.