

**Uputstvo za upotrebu**

**Nobivac Lepto**, inaktivirana vakcina za pse

(za upotrebu u veterinarstvu)

Proizvođač: Intervet International B.V.  
Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

## IME LIJEKA

Nobivac Lepto  
Inaktivirana vakcina za pse.

## KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Doza vakcine sadržiava formalinom inaktiviranu kulturu bakterije *Leptospira interrogans*:  
Serovar *canicola*, soj Ca-12-000,  $\geq 800$  jedinica/ml,  
Serovar *icterohaemorrhagiae*, soj 820K,  $\geq 625$  jedinica/ml,

## INDIKACIJE

Aktivna imunizacija protiv leptospiroze kod pasa koju uzrokuje *Leptospira interrogans* serotip *Canicola* i *Icterohaemorrhagiae*.  
Početak imuniteta: 4 sedmice.  
Trajanje imuniteta: protiv serotipa *Canicola* – 1 godina; protiv serotipa *Icterohaemorrhagiae* – 6 mjeseci.  
Revakcinacija nakon 1 godine.

## KONTRAINDIKACIJE

Samo zdravi psi se trebaju vakcinisati, a prije inokulacije treba provesti odgovarajući klinički pregled. Tokom primjene treba koristiti sterilnu opremu.

Može se upotrebljavati kod gravidnih kuja.

## CILJNE VRSTE

Psi.

## DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Prije upotrebe dobro protresti.  
Vakcinu treba primijeniti subkutanom injekcijom u predjelu vrata ili prsa, uz pridržavanje uobičajenih aseptičnih mjera predostrožnosti.

### **Program vakcinacije**

#### *Primarna vakcinacija:*

Svi psi koji nisu prethodno vakcinisani trebaju biti vakcinisani dva puta u intervalu od 2-4 sedmice. Štenad trebaju imati najmanje 8 sedmica prije primanja prve vakcine.

#### *Revakcinacija:*

Godišnja.

#### **NEŽELJENA DEJSTVA**

Povremeno se može javiti blaga reakcija preosjetljivosti koja prolazi sama od sebe. Lokalna reakcija ograničenog obima može se javiti prvih nekoliko dana nakon vakcinacije.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene u ovom uputstvu, veterinar mora biti informisan i postupiti u skladu s odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Sl.novine FBiH“ br. 15/98 i 70/80).

#### **KARENCA**

Nije primjenjiva.

#### **POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Vakcinu treba čuvati na tamnom mjestu na +2°C do +8°C. Izbjegavati zamrzavanje. Voditi računa da se izbjegne dugotrajno ili ponavljano izlaganje visokim temperaturama. Otvorene ampule treba iskoristiti u okviru jednog radnog dana.

#### **POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

#### **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-24/17-2154/19 J.B., od 18. februara 2020. godine.

#### **OSTALI PODACI**

**Pakovanje:** Plastična kutija u kojoj su bočice vakcine sa: 10x1 doza; 50x1 doza.

**Način izdavanja:** Na veterinarski recept.

**Rok upotrebe:** Rok trajanja veterinarskog proizvoda upakovanog za prodaju: 24 mjeseca.  
Rok trajanja nakon prvog otvaranja bocice: 10 sati.

**ATCvet kod:** QI07AB01

**NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International B.V.; Wim de Körverstraat 35; 5831 AN Boxmeer; Holandija.

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina