
UPUTSTVO ZA LIJEK

NAZIV

Orbenin® LA

za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV:

1 injektor (3 g) sadržava

Aktivne supstance:

kloksacilina u obliku obliku kloksacilin-natrija 200,0 mg

Pomoćna sredstva:

uljnog nosača do 3 g.

INDIKACIJE

Lek je indikovan za intramamrnu primenu u liječenju mastitisa krava, uzrokovanih Gram pozitivnim organizmima.

Da bi se postigli najbolji rezultati trebalo bi ga koristiti kod prvih znakova mastitisa.

Proizvod je indikovan za korišćenje I kod ovaca u lečenju mastitisa u fazi odbijanja janjadi. Orbenin je efikasan protiv *Streptococcus agalactiae* I drugih streptokokus vrsta, penicillin osetljivih streptokoka i *Actinomyces pyogenes*.

Kod stafilocoknog mastitisa veoma je važno adekvatno trajanje liječenja , da bi se postiglo kliničko i bakteriološko izlječenje.

Orbenin LA sa svojim karakteristikama laganog ispuštanja aktivne supstance , stvoren je da zadovolji ove kriterijume.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne daje kravama u suhostaju ,niti životinjama preosjetljivim na β-laktamske antibiotike(peniciline, cefalosporine, cefamicine I dr.)zbog moguće unakrsne alergije.Lijek se ne smije primjenjivati unutar 28 dana prije telenja.

NEŽELJENE REAKCIJE

Nisu primjećene

CILJANE VRSTE :

Krave u toku laktacije

Ovce u periodu odbijanja

DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU, NAČIN I METOD ADMINISTRACIJE:

Dati tri sadržaja injektora po zaraženoj četvrti - jedan špric svakih 48 sati. Pojedinačna šprica se smije koristiti samo jednom.

Primjena: Očistite i dezinficirajte vime poslije muže. Ubacite u vime i primijenite nježan i kontinuirani pritisak dok se ne istisne suspenzija. Tretirane četvrtine mogu se musti u uobičajenom vremenu koje slijedi nakon liječenja.

Ovce

Doziranje: jednokratno ,jedan injektor treba dati u svaku polovicu vimena ovce.

SAVJET O ISPRAVNOJ ADMINISTRACIJI:

Važno je da se slijedi jednostavni higijenski postupak. Jedna osoba treba okrenuti i držati ovcu, dok druga osoba daje lijek. Očistite i dezinficirajte kraj svakog vimena. Stavite vrh injektora na otvor vimena i primijenite nježan, kontinuirani pritisak dok se ne istisne suspenzija u vime. Kanulacija

otvora vimena nije potrebna niti poželjna. Koristite novi injector za svaku polovicu vimena radi izbjegavanja mogućnosti unakrsne kontaminacije tokom aplikacije.

KARENCA:

Meso i organi goveda i ovaca: 7 dana.

Goveda (mlijeko): 96 sati.

Lijek se ne upotrebljava kod ovaca čije se mlijeko koristi za ljudsku upotrebu.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA SKLADIŠTENJE :

Čuvati na suhom mjestu na temperaturi do 25 °C

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA SVAKU CILJANU VRSTU

- Specijalna upozorenja koja trebaju poštovati osobe koje administriraju veterinarski proizvod životnjama:

Penicilin i cefalosporin može izazvati preosjetljivost (alerгију) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta s kožom. Preosjetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporin i obrnuto. Povremeno, alergijske reakcije na ove supstance mogu biti ozbiljne.

Nemojte koristiti ovaj proizvod ako znate da su osjetljivi ili ako ste bili upozoreni da ne radite s takvim preparatima. Rukovati s proizvodom sa velikom pažnjom, radi zaštite, uzimajući u obzir sve preporučene mjere opreza.

Ako se javi simptomi nakon izlaganja, kao što su osip na koži, potrebno je potražiti liječničku pomoć i pokazati doktoru ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili očiju ili problema s disanjem su ozbiljni simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Operite ruke nakon upotrebe.

Korištenje tokom graviditeta, laktacije, nošenja

Orbenin LA je indikovan za korišćenje kod krava u laktaciji i ovaca kod odbijanja jagnjadi.

Ovaj lijek se ne smije koristiti kod krava u suhostaju ili u preventivne svrhe kod krava i ovaca.

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima

Interakcije

Nisu poznate

Predoziranje (simptomi,postupci u slučaju nepredvidjenih situacija , protivotrovi), u slučaju potrebe

Orbenin LA nije iritatant za tkivo vimena i dobro se podnosi kod ciljanih vrsta.
U slučaju nanamernog predoziranja ne očekuju se neželjeni efekti.

Inkompatibilnost

Nije poznata

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal, ako ih ima:

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

ROK UPOTREBE:

3 godine

PAKOVANJE:

Injecto od 3 g.

Kutija sa 12 injectora x3g suspenzije

NAČIN IZDAVANJA :

Lijek se izdaje na veterinarski recept

PROIZVODJAČ:

Haupt pharma Latina s.r.l

Italija, Latina, Borgo san Michele, Strada Statale 156, Km 47,600

ZASTUPNIK:

The HeadHunter d.o.o

Maršala Tita 28

Poslovница zastupanja Zoetis za BiH
Fra Andjela Zvizdovića 1/20
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-24/17-681/17J.B. od 14.decembra 2017. godine