

**Uputstvo za upotrebu**

**Porcilis® Ery**, suspenzija za injekciju, 50 mL  
(za primenu na životinjama)

Proizvođač: Intevet International BV  
Adresa: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija  
Podnosilac zahteva: Intevet International bv, Predstavništvo za BiH  
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

## IME LIJEKA

Porcilis Ery

## KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (2 ml) sadrži:

Inaktiviranog antigena *Erysipelothrix rhusiopathiae*, soj M2 (serotip 2)  $\geq 1$  RPU\*

Adjuvans: 150 mg di- $\alpha$ -tokoferolacetata

\*RPU – jedinica relativne jačine, utvrđena kod miševa u poređenju sa referentnom vakcinom proizvođača

## INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svinja u dobi od 10 sedmica protiv kliničkih znakova bolesti crvenog vjetra. Vakcina se daje isključivo zdravim životinjama.

## KONTRAINDIKACIJE

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i životinje inficirane parazitima. Majčinska antitijela mogu imati negativan uticaj na rezultat vakcinacije.

## NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije na vakcinaciju su ograničene na blago, prolazno povećanje temperature, te blag kratkotrajan otok i ograničeno kretanje kod određenog broja životinja. O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu, potrebno je odmah obavijestiti nadležnog veterinara u skladu s članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Sl. Novine FBiH" br. 15/98 i 70/08).

## CILNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje

## DOZIRANJE, NAČIN PRIMJENE I PROGRAM CJEPLJENJA

Ubrizgavanje 1 doze (2 ml) duboko u mišićno tkivo na vratu, iza uha. Svinje se vakcinišu od 10 sedmice starosti. Vakcinacija se ponavlja nakon četiri sedmice. Dodatne vakcine za pojačavanje efekta se daju krmačama tokom svakog perioda laktacije te veprovima dva puta godišnje. Vakcinisanje veprova i mladih ženki se vrši više od dvije sedmice prije parenja.

Može se upotrebljavati do 2 sedmice prije parenja. Može se upotrebljavati tokom laktacije.

## KARENCA

Meso i jestive iznutrice: 0 dana.

## **POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Čuvati na temperaturi 2-8°C u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati.  
Čuvati van domašaja djece.

## **POSEBNA UPOZORENJA ČUVANJA I UPOTREBE LIJEKA**

Prije upotrebe, vakcina treba dostići sobnu temperaturu (15-25°C) Bočicu protresti prije i povremeno tokom upotrebe. Koristiti sterilne igle i šprice. Otvorene bočice treba potrošiti u roku od 10 sati od otvaranja; nakon toga ih treba baciti. Ne miješati sa drugim vakcinama i supstancama.

## **POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpada ("službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

## **PRIMJENA LIJEKA**

Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“).

## **DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-20/21-211/21 J.B.; od 17.05.2021.godine

**Rok upotrebe:** 2 godine; nakon prvog otvaranja: 10 sati.

**Pakovanje:** Bočica od 50 mL

**ATCvet kod:** QI09AL01

## **NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija.

## **NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Intervet International BV, Predstavništvo za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo.