

AVINEW NEO pjenušava tableta za suspenziju za piliće za primjenu u veterinarstvu

SASTAV

Svaka doza sadrži:

Djelatna tvar:

živi virus Newcastle bolesti, VG/GA-AVINEW soj 5.5 log₁₀EID50(

(*) EID50: infektivna doza po jajetu 50 %.

Pomoćne tvari:

Plava - Brilliant blue FCF (E 133), Hidrolizat kazeina, Manitol, Polividon, Saharoza, Kalijev dihidrogen fosfat, Dikalijev fosfat, Kalijev glutamat, Frakcija V goveđeg albumina, Pročišćena voda, Limunska kiselina, anhidrid, Natrijev hidrokarbonat, Magnezijev stearat

INDIKACIJE

- Aktivna imunizacija protiv Newcastle bolesti svih uzgojnih kategorija peradi.
Početak imuniteta: 14 dana poslije primarnog cijepljenja. Zaštita traje do 6 tjedana.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

Za buduće nesilice i rasplodna jata za ponovno cijepljenje inaktiviranim cjepivom (booster cjepivo) potrebno je pogledati program kompletног cijepljenja.

Učestalost nuspojava je odredena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojavu(e) za vrijeme trajanja tretmana)
- česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
- rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)
- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajevе).

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Perad (brojleri, nesilice, rasplodna jata).

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Brojler pilići:

Primarno cijepljenje jednodnevnih pilića — u oči (kapanje kapljica u oči) ili kroz oči — nos (primjena spreja (krupne kapljice).

Ponovno cijepljenje (revakcinacija) oralnim putem (putem vode za piće): u dobi od 2 do 3 tjedna. Minimalni razmak između dva cijepljenja treba biti 2 tjedna,

Ostale uzgojne kategorije

Dvije doze - u oči (kapanje kapljica za oči) ili kroz oči — nos (primjena spreja (krupne kapljice) ili oralnim putem (putem vode za piće): u dobi od 2 – 3 sedmice i kasnije od 7 do 8 tjedna.

Minimalni razmak između dva cijepljenja treba biti 2 tjedna.

Nakon cijepljenja s pripravkom treba slijediti cijepljenje inaktiviranim cjepivom prije početka leženja jaja kako bi se ostvarila dovoljna učinkovitost,

Način primjene:

Za uspostavu i pripremu cjepiva koristiti čistu hladnu vodu.

Za pripremu i davanje cjepiva koristiti čisti materijal koji ne sadrži dezinfekcijska sredstva i/ili antiseptike.

Prije uporabe otopine cjepiva pričekati da se tablete potpuno otope. Uspostavljeno cjepivo je plava otopina sa slojem fine pjene na površini.

- Pojedinačno cijepljenje

Za 1.000 peradi otopite 1.000-doznu tabletu u 50 ml prokuhanje i ohlađene neklorirane vode za piće pripremljene u čistom spremniku koji ne sadrži dezinfekcijsko sredstvo i/ili antiseptike. Pričekati da se tabletu potpuno otopi, zatim koristiti špricu za prijenos otopine cjepiva u kapaljku.

Preporučuje se cjepivo pripremati u čistom okružju odvojenom od životinja.

Koristiti kalibriranu kapaljku za ukapavanje 50 pl kapljica.

Ukapati jednu kapljicu otopine cjepiva u oko svakog komada peradi, pričekati da se kapljica raširi i zatim pustiti pile.

- Masovno cijepljenje, oralno:

Za 1.000 peradi otopite 1.000-doznu tabletu u količini neklorirane vode za piće koja se treba konzumirati u roku jednog do dva sata.

Ako koristite vodu iz vodovoda, svu vodu koja dolazi u dodir s cjepivom tretirati s obranim mlijekom u prahu i to 2,5 g po litri kako biste neutralizirali tragove klora.

Peradi dati otopinu cjepiva. Dva sata prije cijepljenja peradi se ne smije dati voda.

- Masovno cijepljenje, primjena krupni sprej (prskanje)

Za 1.000 peradi otopite 1.000-doza tabletu u količini neklorirane vode za piće koja odgovara tipu prskalice koju koristite (tlačna prskalica ili prskalica s rotirajućim konusom).

Poprskati otopinu cjepiva iznad peradi koristeći mlaz koji može proizvesti mikrokapljice (prosječni promjer 80 — 100 Hm).

Za dobru distribuciju cjepiva perad treba biti „zbijena” tijekom prskanja.

Ventilacijski sustav peradarnika treba biti isključen tijekom prskanja.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Ne primjenjujete Avinew NEO ako primijetite da vakcina nije dobro skladištena ili je istekao rok valjanosti.

KARENCIJA Nula dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU Držati izvan pogleda i dosega djece. Čuvati u hladnjaku (2 °C do 8 °C).

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C do 8 °C).

Čuvati od zamrzavanja.

Čuvati na suhom mjestu.

Nekorištene tablete ne čuvati izvan blistera.

Blistere čuvati u vanjskom pakiranju (ambalaži).

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda u originalnom pakiranju: 16 mjeseci

Rok valjanosti poslije rekonstitucije prema ovoj uputi: 2 sata

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Cijepiti samo zdrave piliće.

Posebne mjere opreza koje treba poduzeti osoba koja veterinatsko-medicinski proizvod daje životinjama:

Pri rukovanju otopinom cjepiva treba biti pažljiv.

Virus Newcastle bolesti može u ljudi uzrokovati prolazni konjuktivitis. Zato se pri pripremi i davanju otopine cjepiva preporučuje koristiti zaštitnu opremu za disanje i za oči u skladu s važećim europskim normama. Za ostale informacije molimo kontaktirati proizvođača.

Nakon svakog cijepljenja ruke treba oprati i dezinficirati.

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Virus iz cjepiva može se proširiti na necijepljenu perad. Infekcija necijepljene peradi virusom iz cjepiva s cijepljene peradi ne može izazvati znakove bolesti. Štoviše, test povrata virulencije obavljen u laboratoriju pokazao je da virus iz cjepiva ne stječe patogena svojstva nakon 10 davanja u pilića. Stoga se, prema današnjem znanju, prijelaz na necijepljene piliće može smatrati sigurnim.

Ostale mjere opreza

Nema.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Prisutnost dezinfekcijskog sredstva i/ili antiseptika u vodi i materijalu korištenom za otapanje tableta je nespojiva s učinkovitim cijepljenjem.

Ne miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

Nema podataka o sigurnosti i učinkovitosti ovog cjepiva kad se ono koristi s drugim veterinarskomedicinskim proizvodom. Stoga, za svaki slučaj pojedinačno treba odlučiti hoće li se ovo cjepivo koristiti prije ili poslije nekog drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Nema nuspojava

Inkompatibilnosti:

Prisutnost dezinfekcijskog sredstva i/ili antiseptika u vodi i materijalu korištenom za otapanje tableta je nespojiva s učinkovitim cijepljenjem.

Ne miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA AKO IH IMA

Nekorišteni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali takvog veterinarsko-medicinskog proizvoda moraju se zbrinuti u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE:

Primjenu lijeka vrši doctor veterinarska medicine ili diplomirani veterinar ("Ad manum
veterinari")

PAKOVANJE

Poliamid — aluminij — PVC/aluminij blister

Kutija — 1 blister s 10 tableta za 1.000 doza

Kutija — 1 blister s 10 tableta za 2.000 doza

Kutija — 10 blistera s 10 tableta za 1.000 doza

Kutija — 10 blistera s 10 tableta za 2.000 doza

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-20/21 – 470/21 J.B; od 07. oktobra 2021. godine

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

PROIZVOĐAČ:

BOEHRINGER INGELHEIM, Francuska

PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA:

ARNIKA VETERINA SA d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 7,

71000 Sarajevo

BOSNA i HERCEGOVINA