

**Uputstvo za upotrebu**

**Cobactan LC, intramamarni injektor od 8 g**

**(za upotrebu u veterinarstvu)**

Proizvođač: Intervet International GmbH  
Adresa: Feldstrasse 1 a, Unterschleissheim, Njemačka  
Podnositelj zahteva: Intervet International bv, Predstavništvo za BiH  
Adresa: Tešanjska 24 A, Sarajevo

**IME LIJEKA**

Cobactan LC

**KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

Sadržaj intramamarnog injektora od 8 g :

Cefkvinom-sulfat              75 mg

Pomoćne supstance: Parafin.

**DJELOVANJE**

Cefkvinom je antibakterijski lijek koji pripada grupi cefalosporina i djeluje inhibicijom sinteze čelijskog zida. Karakteriše ga širok terapijski spektar djelovanja i visoka stabilnost prema beta-laktamazama.

In vitro, Cefkvinom ima antibiotsko djelovanje protiv uobičajenih gram-negativnih i gram-pozitivnih bakterija uključujući *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae* i *Streptococcus uberis*.

Kao četvrta generacija cefalosporina, cefkvinom kombinuje visoku čelijsku penetraciju sa visokom stabilnošću prema beta-laktamazama.

Za razliku od prethodnih generacija cefalosporina, cefkvinom se ne hidrolizira od strane hromosomski-kodiranih cefalosporinaza tipa Amp-C ili plazmidom-posredovanih cefalosporinaza nekih enterobakterijskih vrsta. Mehanizam rezistencije kod gram-negativnih organizama uslijed proširenog spektra beta-laktamaza (ESBL) i kod gram-pozitivnih organizama uslijed promjene proteina koji vežu penicilin (PBP), može dovesti do unakrsne rezistencije sa drugim beta-laktamima.

**INDIKACIJE**

Za terapiju kliničkog mastitisa kod krava u laktaciji prouzrokovanoj sa bakterijama osjetljivim na cefkvinom: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus* i *Escherichia coli*.

**KONTRAINDIKACIJE**

Ne primjenjivati na životnjama za koje se zna da su preosjetljive na antibiotike cefalosporine i druge β-laktamske antibiotike.

## NEŽELJENA DEJSTVA

U vrlo rijetkim slučajevima su kod životinja **su** zabilježene anafilaktičke reakcije nakon primjene proizvoda.

## CILJNE VRSTE

Krave u laktaciji.

## DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sadržaj jedne šprice nježno uliti u sisu zaražene četvrti vimena svakih 12 sati, nakon svake od tri uzastopne mužnje.

Izmisti zaraženu čevrt/četvrti vimena. Nakon pažljivog čišćenja i dezinfekcije sise i otvora na sisu priloženom maramicom za brisanje, nježno uliti sadržaj jedne šprice u svaku zaraženu četvrt vimena. Rasporediti proizvod nježnom masažom sise i vimena oboljele životinje.

## KARENCA

Meso i iznutrice:	4 dana
Mlijeko:	5 dana (120 sati).

## POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Ne čuvati iznad 25°C.

## POSEBNA UPOZORENJA

Upotreba proizvoda treba se zasnavati na ispitivanju osjetljivosti i pri njoj treba uzeti u obzir zvanične i lokalne antimikrobne politike. Nepravilna upotreba proizvoda može povećati prevalentnost bakterija otpornih na cefkvinom i može smanjiti efikasnost tretmana cefalosporinima, zbog potencijala za unakrsnu rezistenciju.

Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati alergiju nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta kožom. Preosjetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne preosjetljivosti na cefalosporin i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.

Intramamarni injektor mora se koristiti jednokratno. Djelimično iskorišćen injektor mora biti odbačen.

## **POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

## **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-24/17-1788/17 J.B., od 09. maja 2018. godine.

## **OSTALI PODACI**

**Pakovanje:** bijele neprozirne šprice od polietilena i maramice za brisanje u vrećici od papirnog laminata od alumunijumskog kopolimera.

Paketi od 3, 15, 20 i 24 šprice i maramice za brisanje.

Na tržištu se ne moraju pojaviti sve veličine pakovanja.

**Rok upotrebe:** proizvoda upakovanih za prodaju: 24 mjeseca.

**Način izdavanja:** na veterinarski recept.

**ATCvet kod:** QJ51DE90

## **NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intevet International GmbH, Feldstrasse 1 a, Unterschleissheim, Njemačka.

## **NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Intervet International bv, Predstavništvo za BiH, Tešanjska 24 A, Sarajevo.