

CYGRO 1%

Ljekoviti premiks
za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV:

Aktivne supstance:
Maduramicin-amonijum

10 g/kg

Pomoćna sredstva:

Benzilalkohol; kukuruzni kočanj, mleveni

INDIKACIJE

Cygro 1% se koristi u suzbijanju kokcidioze prouzrokovane kokcidijama iz roda *Eimeria* i to kod:

Tovnih pilića: *Eimeria acervulina, E.maxima, E.tenella, E.necatrix, E.brunetti, E.mitis i E.mivati*

Kod čurakastarosti do 16 nedelja : *Eimeria adenoides, E. meleagrimitis, E. dispersa, E. gallapavonis.*

KONTRAINDIKACIJE

Lijek je kontraindiciran -toksičan za sve životinje koje služe u reproduktivne svrhe (rasplodna jata) i kokoškama osiljama konzumnih jaja.

Kontraindicirano je daati ovaj lijek sa drugim kokcidiostaticima, antibioticima i vakcinama.

Lijek je toksičan za sve ostale vrste životinja osim peradi.

Lijek je kontraindicirano davati istovremeno sa tiamulinom, kao i 7 dana prije i poslije primjene tiamulina.

NEŽELJENE REAKCIJE:

Kod peradi može da se javi inapetenca ukoliko se Cygro 1% daje u koncentracijama znatno višim od preporučenih (pri neravnomernom umiješavanju/homogenizaciji u hranu može doći do unošenja povećanih koncentracija leka).

Ukoliko se primjeti neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom Uputstvu, potrebno o tome odmah obavjestiti nadležnog veterinara.

CILJANE VRSTE

-Tovni pilići
-čurići starosti od 16 nedelja.

DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU , NAČIN I METOD ADMINISTRACIJE

Lijek se mijеša samo u smjesama za tzv.strter i grover , namjenjene ishrani tovnih pilića i čurića.Finisher kojem se životinje hrane nakon upotrebe grovera ne smije sadržavati CYGRO1%.

Kod tovnih pilića i čurića CYGRO1% se ne smije koristiti 5 dana prije klanja.

Vrsta	Preporučena doza maduramicin amonijuma	Doza Cygro 1% koja obezbeđuje preporučenu dozu aktivne supstance
Tovni pilići	5 mg/kg	0.5 kg/t hrane
Čurići do starosti od 16 nedelja	5 mg/kg	0.5 kg/t hrane

UPUTSTVO ZA PRIPREMU LJEKOVITE HRANE ZA PROIZVODJAČA:

Uključiti u krmnu smjesu kao ljekoviti premiks i osigurati dobru homogenizaciju u ljekovitoj smjesi.nakon proizvodnje ljekovite smjese, ukoliko ne postoji drugi mikser za mješanje u proizvodnom objektu , dobro očistiti svu opremu za miješanje prije pripreme drugih krmiva/premixa.Preporuka je odvojeno mješati ljekovite krmnesmjese od onih koje ne sadrže kokcidiostatik, koristeći dva odvojena mlina.

MJERE SIGURNOSTI:

Sigurnosne preporuke za osobe koje vrše korištenje sredstva

Štetno ako se proguta

Štetno za organizme koji žive u vodi .Može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

Može štetno djelovati na plod.

Ne udisati prašinu.

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću ,zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči /lice

Sprečiti izloženost -prije upotrebe tražiti posebne upute.

Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se izbjeglo zagadjivanje okoline.

KARENCIJA

Meso i organi peradi :5 dana

Lijek se ne smije davati kokoškama nosiljama čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi ili životinja.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA SKLADIŠTENJE :

Skladištiti na suhom i hladnom mjestu na temperaturi do 25C,
zaštićeno od svjetlosti.

Držati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok upotrebe: 3 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja :upotrebiti odmah

Rok upotrebe nakon miješanja s hranom :3 mjeseca, čuvanjem na temperaturi do 25°C.

SPECIJALNA UPOZORENJA

Za svaku ciljanu vrstu :**nema**

- **Specijalna upozorenja koja trebaju poštovati osobe koje administriraju veterinarski proizvod životinjama:**

Kod mešanja sa hranom, nositi odgovarajuće rukavice, maske i zaštitnu odeću
Koristiti odgovarajuću opremu da bi se sprečilo zagadjivanje okoline.

Čuvati dalje od vatre, vrele površine i vrućine.

Ne pušiti, piti i jesti u kontaktu sa preparatom .

Prevenirati udisanje prašine. Koristiti spoljnju sredinu ili dobro ventilirane prostorije. Može formirati zapaljivu prašinu u vazduhu.Izbegavati ispuštanje preparata u okoliš.

U slučaju inhaliranja proizvoda, izvesti osobu na svež vazduh i omogućiti nesmetano disanje. U slučaju slabosti potražiti medicinsku pomoć . Ne mešati ga sa drugim kokcidiostaticima.

Simultana upotreba sa drugim medicinskim supstancama može biti kontraindikovana.

Korištenje tokom nošenja jaja

Lek se ne sme davati kokoškama nosiljama konzumnih jaja.

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima**Interakcije**

Ne miješati istovremeno s drugim kokcidiostatikom, antibioticima ili vakcinama.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal, ako ih ima:

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

PAKOVANJE:

Višeslojne papirnate vreće od 20 kg.

NAČIN IZDAVANJA :

Na veterinarski recept

BROJ I DATUM ODOBRENJA:UP-I-06-2-24/17-687/17 J.B. od 15.decembra 2017.godine

PROIZVODJAČ:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve Belgium

Registration number αBE101766

ZASTUPNIK :

THE HEADHUNTER D.O.O.

Maršala Tita 28

Poslovница zastupanja Zoetis za BiH

Fra Andjela Zvizdovića 1/20

71000 Sarajevo BiH

BOSNA I HERCEGOVINA