

Antistamin-C
Injekcionalna otopina
Antihistaminik
za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV:

Bezbojna, prozirna sterilna otopina koja u svakom ml sadrži 25 mg Klorfenamina (što je ekvivalent Klorfenamin maleatu)

DJELOVANJE:

Klorfenamin alkilamin je po sastavu antihistaminska materija. Histamin H1 u tkivima djeluje kao antagonistički receptor. Nakon intramuskularne aplikacije u veoma kratkom roku se širi u tkivima i za 2 sata pokazuje znakove poluživota. Jedan dan nakon aplikacije u tkivima spada na nivo koji se teško otkriva te se matabolizira i izlučuje putem mokraće.

INDIKACIJE:

Koristi se kod goveda, konja, ovaca i koza:

- U kombinaciji sa antibioticima se koristi za rješavanje kašlja i bronhospazma kod bolesti respiratornog sistema.
- Kao antihistaminik se koristi kod urtikarija, laminitisa, alergijskog dermatitisa i rinitisa.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Aplicira se intramuskularno, subkutano ili intravenski.

Opšta farmakološka doza: 0,4 – 0,5 mg/kg tjelesne mase.

Praktična doza: 1 ml / 50 kg tjelesne mase.

Trajanje aplikacije: 3 – 5 dana.

POSEBNE KLINIČKE INFORMACIJE I UPOZRENJA ZA CILJANE VRSTE:

Dokazano je da upotreba klorfenamina, kao histaminika intravenskim putem u različitim specifičnim metaboličkim bolestima, kao pomoćne komponente daje dobre rezultate.

Upotreba tokom graviditeta: Upotreba preporučene doze klorfenamina tokom graviditeta ne predstavlja opasnost.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Rijetko se mogu javiti znaci pretjerane žedji.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH"br. 15/98 i 70/08

INTERAKCIJE LIJEKOVA:

Može se upotrebljavati u kombinacij sa kortikosteroidima. Zbog blago sedativnog dejstva ne treba ga koristiti u kombinacij sa barbituratima i opijatima, antikoagulansima, inhibitorima monoaminoooksidaze (MAOI).

SIMPTOMI PREDUZIRANJA, MJERE PREDOSTROŽNOSTI I PROTIOTROVI:

U slučaju pedoziranja mogu se javiti simptomi letargije, hipotenzije, retencija urina i zamućivanje slike. Prekidom aplikacije prestaju simptomi. Intervenisati simptomatski.

KARENCA:

Na meso, jestive organe i mlijeko 0 dana.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne treba aplicirati životinjama koje imaju funkcionalne poremećaje jetre i bubrega, kao ni životinje koje su preosjetljive na klorfenamin ili druge antihistaminike iz ove grupe. .

OPŠTE NAPOMENE:

U slučaju neočekivanih efekata prije upotrbe kontaktirati doktora veterinarske medicine. Čuvati izvan dohvata djece.

UVJETI SKALDIŠTENJA I ROK TRAJANJA:

Čuvati na temperaturu ispod 25 stepeni. Ne stavljati u frižider i ne smije se zamrzavati. Ne izlagati djelovanju sunčeve svjetlosti. Rok trajanja 2 godine od datuma proizvodnje.

UPOZORENJE ZA ODLAGANJA I NE CILJANE VRSTE:

Prazne ili neiskorištene kutije za lijekove treba odložiti u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

PAKOVANJE:

Staklene bočica boje meda, sa 20 ml i 50 ml, zapakovane u kartonske kutije.

NAČIN IZDAVANJA

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („*Ad manum veterinarii*“)

MJESTO PROIZVODNJE:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

UVOZNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

TERRAVET DOO, ul.Sarajevska bb. Gradačac, Bosna i Hercegovina, Tele/fax: 035-819-523

BROJ I DATUM ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U BIH

UP-I-06-2-20/21- 165/22 J.B; od 18. 05. 2022.godine