

Uputstvo za upotrebu

Bravecto Spot-On, otopina za mačke:

- Male mačke, 112,5 mg
- Mačke srednje veličine, 250 mg
- Velike mačke, 500 mg

(za primjenu u veterinarstvu)

Proizvođač: Intervet International bv

Adresa: Walton Manor; Milton Keynes MK7 7AJ; United Kingdom

Dodatno proizvodno mjesto: Intervet Productions; Rue de Lyons; 27460 Igoville; France

Podnositelj zahtjeva: Intervet International bv

Adresa: Tešanjska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

IME LIJEKA

- Bravecto spot-on otopina 112,5 mg; za male mačke (1,2 - 2,8 kg)
- Bravecto spot-on otopina 250 mg; za mačke srednje veličine (>2,8 - 6,25 kg)
- Bravecto spot-on otopina 500 mg; za velike mačke (>6,25 - 12,5 kg)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki ml sadrži 280 mg fluralanera.

	Sadržaj pipete (ml)	Fluralaner (mg)
Male mačke 1,2 – 2,8 kg	0,40	112,5
Mačke srednje veličine > 2,8 – 6,25 kg	0,89	250
Velike mačke > 6,25 – 12,5 kg	1,79	500

CILJNE VRSTE

Mačke.

INDIKACIJE

Zaštita mačaka od infestacije krpeljima i buhami.

- neposredna i trajna aktivnost ubijanja buha (*Ctenocephalides felis*) tokom 12 sedmica.
- neposredna i trajna aktivnost ubijanja krpelja (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *I. hexagonus*) tokom 12 sedmica.
- neposredna i trajna aktivnost ubijanja grinja (*Demodex canis*) tokom 12 sedmica.

Buhe i krpelji se moraju pričvrstiti na domaćina i započeti hranjenje kako bi bile izložene aktivnoj tvari.

Lijek je dio terapije kod pojave alergijskih dermatitis uzrokovanih infestacijom buha.

Lijek se ne koristi u liječenju mačića ispod 1,2 kg tjelesne težine, odnosno mlađih od 11 sedmica starosti.

Proizvod se ne smije davati u razmacima kraćim od 8 sedmica zato što nije vršeno ispitivanje sigurnosti za kraće razmake.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na aktivnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.

NEŽELJENE REAKCIJE

Tokom kliničkih studija opaženi su pojedinačni slučajevi (2,2% tretiranih mačaka) blagih, prolaznih kožnih reakcija na mjestu primjene, kao što su eritem i pruritus.

Sljedeći znakovi su opaženi ubrzo nakon primjene: apatija/tremor/anoreksija (0,9% tretiranih mačaka) ili povraćanje/hipersalivacija (0,4% tretiranih mačaka).

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH"br. 15/98 i 70/08)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Za spot-on primjenu.


Bravecto spot-on treba primjenjivati u skladu sa sljedećom tabelom koja odgovara dozi od 40-94 mg fluralanera po kilogramu tjelesne težine:

Tjelesna težina mačke (kg)	Jačina i broj pipeta koje treba primijeniti		
	Bravecto 112,5 mg	Bravecto 250 mg	Bravecto 500 mg
1,2-2,8	1		
> 2,8 – 6,25		1	
> 6,25 – 12,5			1


Za mačke tjelesne težine veće od 12,5 kg, koristiti kombinaciju dvaju pipeta koje najbliže odgovaraju tjelesnoj težini životinje.

Način primjene lijeka:

Korak 1: Neposredno prije upotrebe, otvoriti vrećicu i izvaditi pipetu. Pipetu treba držati za dno ili za gornji kruti dio ispod kapice u uspravnom položaju (vrhom prema gore) kako bi se otvorila. Kapicu koja se otvara okretanjem, treba okrenuti u smjeru kazaljke na satu za jedan puni okret. Kapica će ostati na pipeti; nije ju moguće skinuti. Pipeta je otvorena i spremna za primjenu kada se osjeti lomljjenje zaštitne brtve.



Korak 2: Mačka treba stajati ili ležati sa leđima u horizontalnom položaju tokom primjene proizvoda. Postaviti vrh pipete na bazu lobanje mačke.



Korak 3: Stisnite pipetu nježno i primijenite cijeli sadržaj direktno na kožu mačke. Proizvod treba primijeniti na jednom mjestu, na bazi lobanje, na mačkama tjelesne težine do 6,25 kg; odnosno na dva mesta na mačkama tjelesne težine veće od 6,25 kg.

Raspored liječenja:

Za optimalnu kontrolu zaraze krpeljima i buhamama, proizvod treba primjenjivati u razmacima od 12 sedmica.

KARENCA

Neprimjenjivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Ne čuvati iznad 30°C. Pipete se moraju čuvati u vrećicama radi zaštitite od gubitka otapala ili upijanja vlage. Vrećice treba otvoriti neposredno prije upotrebe.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere predostrožnosti za upotrebu kod životinja

Treba obratiti pažnju da se izbjegne kontakt sa očima životinje. Ne koristiti direktno na lezijama kože. U nedostatku dostupnih podataka, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne bi trebao koristiti u liječenju mačića mlađih od 11 sedmica i/ili mačaka težine manje od 1,2 kg. Proizvod se ne smije давати u razmacima kraćim od 8 sedmica zato što nije vršeno ispitivanje sigurnosti za kraće razmake.

Posebne mjere predostrožnosti koje treba preduzeti lice koje daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama

Proizvod čuvati u originalnom pakovanju sve do same upotrebe, kako bi se sprječilo da djeca dođu u direktni kontakt sa proizvodom.

Iskorištenu pipetu treba odmah zbrinuti.

Izbjegavati kontakt sa kožom i/ili okom, uključujući dodirivanje oka rukom.

Ne jesti, pitи ili pušiti dok se rukuje proizvodom.

Ruke i kožu koja je bila u kontaktu sa proizvodom temeljito oprati sapunom i vodom odmah nakon upotrebe proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima, odmah temeljito isprati vodom.

Ako dođe do slučajnog gutanja, potražiti pomoć ljekara i ljekaru pokazati letak iz pakovanja ili etiketu.

Ovaj proizvod je lako zapaljiv. Držati dalje od izvora toplote, iskri, otvorenog plamena ili drugih izvora zapaljenja.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpada ("službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

OSTALI PODACI

Pakovanje: Pipeta sa jediničnom dozom napravljena od laminiranog aluminijuma/polipropilenske folije zatvorene poklopcom od HDPE i upakovana u vrećicu od laminirane aluminijumske folije. Svaka kartonska kutija sadrži 1 ili 2 pipete. Na tržištu se ne moraju pojavitи sve veličine pakovanja.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: Bravecto Spot-On od 112,5 mg – 2 godine.
Bravecto Spot-On od 250/500 mg – 3 godine.

ATCvet kod: QP53BX05

BROJ I DATUM ODOBRENJA

Bravecto spot-on otopina 112,5 mg; za male mačke (1,2 - 2,8 kg) UP-I-06-2-20/21-2633/21 J.B; od 21. februara 2022. godine

Bravecto spot-on otopina 250 mg; za mačke srednje veličine (>2,8 - 6,25 kg); UP-I-06-2-20/21-2632/21 J.B; od 21. februara 2022. godine

Bravecto spot-on otopina 500 mg; za velike mačke (>6,25 - 12,5 kg); UP-I-06-2-20/21-2631/21 J.B; od 21. februara 2022. godine

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International B.V., Walton Manor; Milton Keynes MK7 7AJ; United Kingdom

Dodatno proizvodno mjesto: Intervet Productions; Rue de Lyons; 27460 Igoville; France.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International bv, Predstavništvo za BiH, Tešanjska 24 A, Sarajevo.