

FATROXIMIN ENDOUTERINO SCHIUMA

**Endouterina pjena za krave i kobile koje ne služe u ishrani ljudi
Za upotrebu u veterinarstvu**

SASTAV

1 sprej boca (bombola od 13,4 g) sadrži:

Rifaksimin 100 mg

Nosača do 13,40 g

DJELOVANJE

Proizvod je endouterina pjena na bazi sintetskog antibiotika rifaximina, koji je iz porodice ansamicina. Mehanizam djelovanja rifaximina se ogleda u interakciji RNA-polimeraze koja je ovisna od DNA i ona sprečava sintezu proteina bakterija.

Spektar djelovanja rifaksimina podrazumjeva da uglavnom djeluje na Gram + bakterije, (streptokoke, stafilokoke, klostridije, aktinomicete, fusobakterije), kao i neke od Gram – bakterije, uključujući anaerobe.

INDIKACIJA

Fatroximin pjena se koristi se u liječenju bakterijskih infekcija ženskih genitalnih organa krava i kobila koje nisu namjenjene ishrani ljudi, i to: endometritisa akutnog i hroničnog, piometritisa, metritisa, cervicitisa i vulvovaginitisa, vaginitisa izazvanih Gram-pozitivnim bakterijama, (streptokoke, stafilokoke, klostridije, aktinomicete, fusobakterije), kao i nekim od Gram- negativnim bakterijama, uključujući anaerobe.

Lijek se primjenjuje na osnovu antibiograma.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Primjenjuje se intra/uterino.

Krave: kod endometritisa, piometritisa, metritisa i cervicitisa 1/2 do 2 bombole (što odgovara 50 do 200 mg rifaximina po životinji). Količina lijeka koja se koristi zavisi i od veličine uterusa životinje. Kod piometritisa obavezno prije aplikacije lijeka očistiti sadržaj iz šupljine uterusa, pa tek onda aplicirati lijek.

Kod vulvovaginitisa: jednu + jednu bombolu (što odgovara 100 mg + 100 mg lijeka) u razmaku od 24 sata.

Kobile: kod endometritisa akutnih i hroničnih aplicirati 1-4 bombole što odgovara 100-400 mg lijeka) po životinji, ovisno o veličini uterusa.

Prije primjene bombolu dobro protresti.

NAČIN APLIKACIJE

Krave: Prvo se fiksira cerviks rektalno i nakon dezinfekcije vulvarnih usta se ubaci kateter u cerviks i onda se bombola poveže sa kateterom i aplicira lijek pod pritiskom na bombolu.
Kobile: Cerviks vaginalno lijevom rukom fiksirati i ubaciti kateter u vaginu i ubaciti ga duboko u unutrašnjost uterusa, zatim povezati kateter sa bombolom i priskom ruke ubrizgati sav sadržaj u uterus životinje.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne primjenjivati lijek kod životinja koje su osjetljive na rifaksimin ili na antibiotike iz grupe anzamicina.

NUSPOJAVE

Kod osjetljivih životinja moguće su alergijske reakcije. Također, može doći do zadržavanja vode, te oticanja ekstremiteta, mučnine i dr. Ozbiljnije nuspojave mogu uključivanje oticanja jezika i usana, svrbež, osip i druge promjeni na koži, otežano disanje i kolaps. U slučaju predoziranja mogu se pojaviti razderotine na zidovima uterusa.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

KARENCA

Lijek se **ne** upotrebljava na životnjama koje se koriste ili se njihovi proizvodi koriste, u ishrani ljudi.

NAČIN IZDAVANJA:

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE:

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, svježem i tamnom mjestu.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

ROK UPOTREBE

3 godine

NAČIN PAKOVANJA

Pakovanje 6 bombola (sprej bočica) i rukavice za jednokratnu upotrebu.

BROJ I DATUM ODOBRENJA ZA BIH:

UP-I-06-2-20/21-1210/22 J.B, 21. novembra 2022. godine

Vlasnik i proizvođač: **Fatro s.p.a Italy** www.fatro.it

Uvoznik i distributer: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje** BiH.

www.sintofarm-adriatica.com