

FENLEVE 10

SASTAV u 1 ml

Ketoprofen 100 mg

Nosač: Benzol alkohol (E1519) 10 mg, voda sterilna do 1 ml

DJELOVANJE

FENLEVE 10 u svom sastavu sadrži ketoprofen koji ima antiinflamatorno dejstvo, a nije steroidno. Ketoprofen je derivat od arilpropionata koji inhibira sintezu prostaglandina pojačavajući metabolizam derivata arahidne kiseline. Lijek se koristi kod različitih vrsta infekcija – upalnih stanja i ima karakteristike antipiretika.

INDIKACIJE

Goveda: terapija svih vrsta infekcija, jak je analgetik i antipiretik, a naročito se preporučuje kod patologije mišića i skeleta. Koristi se kod liječenja artritisa, životinja koje hramaju, različitih vrsta mehaničkih trauma, isčašenja, infekcija respiratornih organa, akutnih mastitisa, edema vimena kao i kod različitih oblika kolika.

Konji: terapija različitih infekcija, mehaničkih oštećenja i infekcija mišića i skeleta, kod svih febrilnih stanja i različite oblike kolika probavnoq i urinarnoq trakta.

Svinje: Koristi se u terapiji različitih infekcija respiratornih organa, infekcija lokomotornog sistema, sindroma mastitis, metritis i agalakcije (MMA) kod krmača kao i svih febrilnih stanja izazvane različitim oblicima infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti lijek kod životinja koje imaju insufijenciju bubrega, srca i jetre, kod svih oblika hemoragija. Ne smije se koristiti zajedno sa steroidnim lijekovima i može se aplicirati intraarterijski.

Lijek nije indikovan u periodu graviditeta.

Lijek se ne smije davati u toku graviditeta kobila i krmača, posebno u prvom mjesecu graviditeta, te kod trkačih konja 15 dana prije utrke.

Ne koristi kod ždrebadi ispod 15 dana starosti

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Proizvod se može aplicirati intramuskularno i intavenozno u sljedećim dozama:

Goveda: 3 ml / 100 kg žive mase (što odgovara 3 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)

Konji: 1ml / 45 kg žive mase (što odgovara 2,2 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)

Svinje:

3 ml / 100 kg žive mase (što odgovara
3 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na
dan)

Terapiju ponoviti tokom 3-5 dana.

Ne koristi kod ždrebadi ispod 15 dana starosti.

NUSPOJAVE

Mladim životinjama izbjegavati davati ovaj lijek. Ne smije se davati ždrijebadima mlađima od 15 dana.

Kod predoziranja lijekom mogu se manifestirati poremećaji funkcije bubrega i organa probavnog trakta.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za upotrebu na životinji

Ovaj lijek je posebno rizičan za upotrebu na veoma mladim i veoma starim životinjama. Ukoliko se lijek ipak primjenjuje u tim okolnostima, potrebno je obatit pažnju na hipovolemiiju, dehidraciju i hipotenziju, što se može negativno odraziti na bubrege. Izbjegavati istovremeno upotrenu neurostatika. Ne koristi kod ždrebadi ispod 15 dana starosti.

Lijek se ne smije davati u toku graviditeta kobila i krmača, posebno u prvom mjesecu graviditeta.

Posebne mjere opreza za osobu koja aplicira lijek

Izbjegavati kontakt sa lijekom u slučaju preosjetljivosti. U slučaju nehotičnog injiciranja odmah kontaktirati ljekara i ponijeti na uvid uputstvo ovog lijeka.

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Ne smije se koristiti zajedno sa steroidnim lijekovima, antidijureticima i antikoagulantima.

Ne smije se prinjenjivati sa drugim NSAIL, jer se obimno vežu za proteine plazme, što za posljedicu može imati toksičan efekat ketoprofena.

KARENCA

- Goveda:

- * Nakon intravenozne aplikacije:
 - Meso i unutrašnji organi: 0 dana.
 - Mlijeko: 0 dana
- * Nakon intramuskularne aplikacije:
 - Meso i unutrašnji organi: 4 dana.
 - Mlijeko: 0 dana

- Konji:

- * Bez obzira na aplikaciju:
 - Meso i unutrašnji organi: 4 dana
 - Mlijeko: 0 dana
 - Ne koristi kod ždrebadi ispod 15 dana starosti
- Svinje:
 - * Bez obzira na aplikaciju:
 - Meso i unutrašnji organi: 4 dana

NAČIN IZDAVANJA:

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“).

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, mračnom i hladnom prostoru.

Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

3 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora utrošiti u roku od 28 dana.

PAKOVANJE

100 ml boćica, 250 ml boćica, 500 ml boćica

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-2690/22; J.B, od 21. 11. 2022. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy – Casella Postale/P.O. box 2

UVODNIK I DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, VIII ulica br. 57, 76270 Orašje, BiH

Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com