

GEOMYCIN® F, 1 g, intrauterina tableta, za krave, kobile, krmače
Za upotrebu u veterinarstvu

IME LIJEKA

GEOMYCIN® F, 1 g, intrauterina tableta, za krave, kobile, krmače

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadržava:

Djelatna tvar:

Oksitetraciklin hidroklorid 1 g

Pomoćne tvari: kukuruzni škrob, vinska kiselina, natrijev hidrogenkarbonat, želatina, polioksietilen cetil-eter, magnezijev stearat, dietanolamid masne kiseline ulja kokosa, talk

DJELOVANJE

Oksitetraciklin (OTC) je antibiotik širokog antimikrobnog spektra. Osobito je učinkovit u liječenju puerperalnih infekcija. Koji rast i razmnožavanje velikog broja gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, a djeluje i protiv spiroheta, rikecija i nekih protozoa.

Geomycin® F tablete lako su topljive, a u dodiru sa sadržajem uterusa nastaje znatna količina pjene ugljičnog dioksida. Ugljični dioksid raspodjeljuje OTC po šupljini maternice, a također potiče njegov prodror u dublje slojeve sluznice gdje uvećava koncentraciju OTC-a. Osim toga, pjena ugljičnog dioksida mehanički čisti površinu endometrija, evakuira prisutne bakterije, tonizira miometrij i stimulira ga na kontrakcije.

INDIKACIJE

Liječenje puerperalnih infekcija genitalnih organa krava, kobila i krmača uzrokovanih bakterijama osjetljivim prema OTC-u. Intrauterina primjena Geomycin® F tableta posebno je indicirana u slučajevima:

- zaostajanja posteljice;
- endometritisa;
- puerperalne piometre;
- uvrtanja i izvale maternice;
- pobačaja, teških poroda, povreda porođajnih putova;
- fetotomije;
- infekcije bakterijom *Campylobacter fetus*.

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost životinja na sastojke tablete, a što je u praksi gotovo nepoznato.

Lijek se ne smije koristiti tokom graviditeta.

Lijek se ne smije koristiti sa drugim antibioticima intrauterino.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave, kobile, krmače.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

Geomycin® F tableta stavlja se cijela u uterus.

Terapija: 1-2 tablete. Jednokratno.

U težim slučajevima liječenje se ponovi nakon 48 sati.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU PRIMJENU LIJEKA

Nema li u maternici tekućeg sadržaja ili ga je nedostatno tableta može lokalno dražiti. U takvim slučajevima treba, prije stavljanja tablete, sterilnim kateterom i.uterino infundirati 200-400 ml prokuhanе vode, čiste fiziološke otopine ili otopine fosfatnog pufera.

Ako je pak u maternici obilje tekućeg sadržaja, treba ga ukloniti prije stavljanja tablete Geomycin® F.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 10 dana.

Mlijeko: 8 dana.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

Čuvati ispod 25 °C.

Zaštititi od svjetla.

Rok valjanosti označen je na opremi, u originalnoj ambalaži: 18 mjeseci.

Tabletu treba iskoristiti neposredno nakon otvaranja folije.

Ne koristiti poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji i blisteru.

POSEBNA UPOZORENJA

Geomycin® F tabletu ne smije se životinjama dati p.o.

Mala tableta silikagela služi za navlačenje vlage i nije za uporabu.

Nužno je paziti da se prilikom intrauterine aplikacije tablete ne prouzroči dodatna infekcija.

Zbog toga prije davanja treba toplom vodom i sapunom oprati ruke do ramena te vanjske dijelove i okolinu spolnih organa životinje. Savjetuje se upotrijebiti čiste porodiljske rukavice prilikom aplikacije ovog lijeka.

Nakon davanja tableta ruke treba oprati čistom vodom.

Geomycin® F tableta ne primjenjuje se tijekom graviditeta.

Ne postoje kontraindikacije za upotrebu u razdoblju laktacije.

Istovremeno s Geomycin® F tabletom, intrauterino se ne smije stavljati druge lijekove. Ako je potrebno usporedno sustavno davati antibiotike, oni se moraju u učinku nadopunjavati s oksitetraciklinom.

Zbog osobitosti načina primjene tableta (intrauterino) opasnost od predoziranja je minimalna, kao i posljedična pojava štetnih sustavnih učinaka.

Sigurnost za okoliš:

Nema opasnosti ako se lijek koristi u skladu s uputom.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrijebljeni lijek ili otpadni materijali dobiveni primjenom tog lijeka treba se odlagati u skladu s *Zakonom o upravljanju otpadom* („Službene novine Federacije BiH, 33/03).

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-20/21-2456/22 J.B, od 21. 11. 2022. godine

NAČIN IZDAVANJA

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE

Lijek može aplicirati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („*Ad manum veterinarii*“).

PAKOVANJE

Kutija sa 10 tableta/pesarija.

ATCvet kôd: QG51AA01

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Genera d.d.

Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Hrvatska

NAZIV I ADRESA NOSIOCA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genera d.o.o.

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina