

**HEPAGEN**  
**Injekcioni rastvor za konje, goveda, koze i svinje**  
**Za upotrebu u veterinarstvu**

**SASTAV**

1 ml sadrži:

Natrij 2 metil-fenoksi propionska kiselina (mefepronska kiselina) 100,0 mg

Nosač do 1 ml.

**DJELOVANJE**

Hepagen je injekcioni rastvor koja sadrži 10 % acidofenozu 2 metil 2 propionat. Djeluje zaštitno na jetru i nije toksičan. Primjenjuje se i/m, e/v i i/peritonelno. Može se primjenjivati kod svih bolesti koje izazivaju oštećenja jetre. Djeluje antispazmolitički, jak je antidolorifik, jer umanjuje bolove kod upale žučne kese. Pojačava sekreciju bilirubina i stimuliše rad digestivnog trakta kod raznih metaboličkih oboljenja. Djeluje stimulatorno na glandularni sistem organizma neovisno od sistema parasimpatikusa, a time i poboljšava rad jetre, pankresa, žučne kese i svih organa digestivnog trakta.

**INDIKACIJE**

Koristi se kod konja, goveda, koza i svinja pri liječenju probavnih smetnji, trovanja sa hranom (enterotoksemija), metaboličkih bolesti (ketoze, acetonemije), svih vrsta meteorizma, preopterećenosti probavnog trakta, anoreksije, kao dopuna specifičnoj terapiji u liječenju parazitoza gastrointestinalnog trakta i insuficijencije jetre.

Kod konja se naročito preporučuje kod liječenja piroplazmoze, leptospiroze i svih oblika insuficijencije jetre i pojave kolika.

Kod svinja, enteroksemije, distrofije jetre, edema, gubitka apetita, opstipacija.

**DOZIRANJE I PRIMJENA**

i/m duboko i sporo aplicirati lijek; i/peritonealno i i/v sporo aplicirati.

Telad, koze, svinje i ždreibad: 5ml-15 ml/životinji

Goveda i konji: do 300 kg doza je 30 ml/životinji;  
do 500 kg doza je 40 ml/životinja i  
preko 500 kg doza je 50 ml /životinja.

Prasad : 1ml/10 kg tjelesne težine

Doze mogu biti ponovljene **za 24 sata** na zahtjev veterinara.

**KONTRAINDIKACIJE:**

Hepagen se ne smije miješati sa rastvorima Kalcijuma.

**NUSPOJAVE:**

Nisu zabilježene.

**U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama**

člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

#### INTERAKCIJE

Lijek se ne treba mješati s drugim lijekovima zbog nedostatka adekvatnih studija kompatibilnosti.

#### KARENCA

- Meso: 0 dana
- Mlijeko: 0 dana

#### NAČIN IZDAVANJA:

Ljek ne podliježe izdavanju.

#### NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („*Ad manum veterinarii*“)

#### NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, prozračnom i tamnom mjestu.

#### ROK UPOTREBE

4 godine

Nakon otvarnja može se koristiti 28 dana.

#### POSEBNE MJERE ZA ODLAGANJE LIJEKA I NJEGOVOG OSTATKA:

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

#### PAKOVANJE

100 ml boca (sa čepom, lakim za otvaranje)

#### BROJ I DATUM ODOBRENJA ZA BIH:

UP-I-06-2-20/21- 1215/22 J.B, od 21 novembra 2022. godine

#### PROIZVOĐAČ:

**Fatro** s.p.a Italy [www.fatrol.it](http://www.fatrol.it)

#### DISTRIBUTER:

**SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje** BiH.

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)