

**MASTICEF**

Antibiotik

Intramamarna suspenzija

**Za upotrebu u veterinarstvu****1. NAZIV I ADRESA ODGOVORNOG SUBJEKTA I PROIZVOĐAČA  
ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE SERIJE, AKO SU RAZLIČITI**Odgovorni subjekt:

Biowet Dwalew sp.z o.o. (d.o.o.)  
ul. Grójecka 6, 05-651 Dwalew

Proizvođač odgovoran za puštanje serije:

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynarnego Spółka Akcyjna ul.  
Grójecka 6, 05-651 Dwalew (*Bioveterinarski zavod d.d. ul. Grójecka 6, 05-651  
Dwalew*)

**2. NAZIV MEDICINSKO-VETERINARSKOG PROIZVODA**

Masticef, 250 mg/8g, intramamarnasuspenzija za goveda

**3. SADRŽAJ AKTIVNE (IH) SUPSTANCI I OSTALIH TVARI**

Aktivnasupstanca:

Cefacetrilnatrijum 250 mg/8 g

**4. INDIKACIJE**

Liječenje akutnog, kroničnog i subkliničkog mastitisa kod krava u laktaciji uzrokovanih mikroorganizmima *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus* (isto i rodovi osjetljivi na penicilin kao i rezistentni), *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*

**5. KONTRAINDIKACIJE**

Preosjetljivost na beta-laktamske antibiotike.

**6. NUSPOJAVE**

Bol na mjestu aplikacije, alergije, oštećenja bubrega.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

**7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA**

Goveda (krave u laktaciji)

**8. DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU ŽIVOTINJA, ADMINISTRACIJA(E) I NAČIN PRIMJENE**

Ubrizgati sadržaj 1 šprica (8 g) odjednom u svaku zahvaćenu četvrtinu vimena. Proizvod treba ubrizgati u vime nakon temeljne muže i dezinfekcije područja oko otvora sise. Dovoljno je jednokratno davanje sadržaja 1 šprica odjednom. U teškim ili hroničnim slučajevima, tretman treba ponoviti nakon 24 - 48 sati.

**9. PREPORUKE ZA ISPRAVNU ADMINISTRACIJU**

Proizvod treba ubrizgati u vime nakon temeljne muže i dezinfekcije područja oko otvora sise. Preporučljivo je redovno pražnjenje zahvaćenog vimena, što značajno ne smanjuje nivo antibiotika u mlječnoj žlijezdi.

**10. KARENCA**

Jestiva tkiva - 7 dana od posljednje aplikacije,  
Mlijeko – 4 dana od posljednje aplikacije.

## **11. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA SKLADIŠTENJE**

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ne koristiti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na etiketi. Datum isteka je posljednji dan navedenog na etiketi mjeseca.

## **12. POSEBNA UPOZORENJA**

Posebne mjere opreza za za primjenu kod životinja:

Primjena proizvoda treba se zasnivati na testiranju osjetljivosti te imati u vidu službene i lokalne principe antibioticske terapije. Nepravilna primjena proizvoda može izazvati širenje bakterija otpornih na cefacetril i smanjenje efikasnosti liječenja drugim beta-laktamskim antibioticima zbog unakrsne rezistencije.

Posebne mjere opreza koje treba poduzeti osoba koja daje lijek životinjama:

Penicilin i cefalosporin mogu izazvati reakcije preosjetljivosti (alergijskog karaktera) nakon parenteralne primjene lijeka, nakon slučajnog udisanja, gutanja i kontakta sa kožom. Preosjetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne preosjetljivosti na cefalosporin i obrnuto. Alergijska reakcija na ove supstance može u nekim slučajevima biti ozbiljna.

Osobe kod kojih je utvrđena preosjetljivost ili kojima je preporučeno izbjegavanje kontakta sa takvim supstancama ne bi trebalo da dolaze u kontakt sa tim tvarima. Sa proizvodom treba postupati sa velikom pažnjom, poduzimajući sve preporučene mjere opreza kako bi spriječili slučajno izlaganje djelovanju proizvoda. Ako se kod slučajnog kontakta sa proizvodom pojave simptomi kao što je osip na koži, obratite se ljekaru i pokažite mu ambalažu proizvoda ili informativni letak. Oticanje lica, usana i područja oko očiju ili otežano disanje su mnogo teži simptomi i mogu iziskivati hitnu medicinsku pomoć. Operite ruke nakon primjene proizvoda.

Trudnoća i dojenje:

Proizvod je namjenjen za primjenu tokom laktacije i može se koristiti kod krava u laktaciji. Proizvod se može koristiti tokom trudnoće.

## **13. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEISKORIŠTENIH PROIZVODA ILI SA NJIMA VEZANOG OTPADNOG MATERIJALA, AKO JE PRIMJENJIVO**

Lijekove se ne smiju bacati u kanalizaciju niti u smeće. Našin odlaganja neiskorištenih lijekova i ambalaže mora biti u skladu sa odrdbama Zakona o upravljanju otpadom ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03). Ovo će doprinijeti efikasnoj zaštiti okoliša.

## **14. NAČIN IZDAVANJA**

Lijek ne podliježe izdavanju.

## **15. NAČIN PRIMJENE**

Lijek može aplicirati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

**16. PAKOVANJE:**

LDPE turbo intramamarna šprica koja sadrži 8 g suspenzije, pakovana po 4 kom.  
u kartonskoj kutiji

**17. UVOZNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU**

TERRAVET DOO, ul.Sarajevska bb. Gradačac, Bosna i Hercegovina, Tele/fax:  
035-819-523

**18. BROJ I DATUM ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U BIH**

UP-I-06-2-20/22-217/22 J.B; od 16. maja 2022. godine