

METATOP
Injekcionala otopina
Nesteroidni antiinflamatorik
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV:

Metatop je otopina za injekciju je bistra, bezbojna do blago žućkasta otopina, koja u svakom ml sadrži 500 mg metamizol natrijum monohidrata.

DJELOVANJE:

Metamizol je antiflogistički, analgetički, antipiretički i spazmolitički efikasan spoj pirazolona. Metamizol inhibira sintezu medijatora upale (prostaglandin E2, prostanoidi) i ima direktne ili indirektne efekte na više autonomne centre u centralnom nervnom sistemu, ublažavanje upalnih i reumatskih reakcija, povećanje praga boli, otklanjanje grčeva glatkih mišića, obnavljanje poremećene peristaltike, povećanje cirkulacije krvi u poprečnoprugastim mišićima i tkivima širenjem perifernih žila, pomaže u liječenju mnogih bolesti opuštajući mišiće i snižavajući temperaturu. Njegova bioraspoloživost je visoka.

Brzo i potpuno se apsorbira sa mesta aplikacije. Brzo se transformiše u aktivni metabolit u tkivima, dostižući maksimalnu koncentraciju u plazmi i tkivu u roku od pola sata. Njegov efekat počinje rano i traje nekoliko sati (obično do 4-8 sati). Njegova distribucija je visoka. Dobro prodire u telesne tečnosti, tkiva i centralni nervni sistem. Ne akumulira se u organizmu. Brzo se izlučuje urinom.

INDIKACIJE:

Metatop se koristi kod konja, goveda i pasa kao antiinflamatorik, analgetik, spazmolitik i antipiretik.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Metatop se primjenjuje sporo intravenski i intramuskularno. Subkutana primjena se ne preporučuje jer može izazvati reakcije tkiva.

Njegova farmakološka doza je 20-60 mg/kg tjelesne težine kod konja, 20-40 mg/kg tjelesne težine kod goveda i 50-100 mg/kg tjelesne težine kod pasa.

U slučaju jakih bolova i drugih vrlo bolnih slučajeva, prema procjeni veterinara, moguće je povećati dozu na 6 - 8 ml/100 kg tjelesne težine. Primjena se može ponoviti 1-2 puta dnevno u razmaku od 8 sati, ovisno o potrebi.

Osim ako veterinarian drugačije ne preporuči, praktične doze za različite životinjske vrste su sljedeće:

- Konj (na 500 kg): 20 - 60 ml
- Govedina (na 500 kg): 20 - 40 ml
- Pas (na 10 kg): 1 - 2 ml

POSEBNE KLINIČKE INFORMACIJE I UPOZORENJA ZA CILJNE VRSTE:

Ne treba ga koristiti kod trkačih konja u roku od 5 dana prije i nakon trke.

Upotreba tokom graviditeta: Može izazvati depresiju disanja kod fetusa prolaskom kroz placentu.

NEŽELJENI DEJSTVA:

Agranulocitoza i leukopenija mogu se javiti pri dugotrajnoj primjeni metamizola. Iz tog razloga, tokom liječenja treba periodično raditi krvnu sliku.

Ne treba ga koristiti kod životinja čija koštana srž i proizvodnja krvi nisu zdravi.

Budući da djeluje na CNS i kardiovaskularni sistem, treba ga oprezno primjenjivati kod starijih životinja sa kardiovaskularnim oboljenjima. Može uzrokovati egzil, letargiju, euforiju, razdražljivost, mokrenje krvi, poremećaj hoda i preosjetljivost tipa serumske bolesti, ulceroznu upalu usta, upalu jetre i bubrega. Može izazvati mučninu i povraćanje kod mesojeda. Sklonost krvarenju može se povećati jer metamizol potiskuje stvaranje protrombina. Na mjestu injekcije može doći do prolazne lokalne upale i otoka. Ako se pojavi otok, može se staviti topli zavoj.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH"br. 15/98 i 70/08)

INTERAKCIJA LIJEKOVA:

Ne treba ga koristiti zajedno sa fenilbutazonom i barbituratima. Budući da će uzrokovati hipotermiju kada se koristi istovremeno sa hlorpromazinom, ne bi se trebao koristiti zajedno. Ne treba ga koristiti sa salicilnom kiselinom.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne davati subkutano.

Ne davati životnjama sa poremećajima hematopoetskog sistema.

Može se pojaviti preosjetljivost na metamizole. Zabanjena je primjena kod životinja s težim oštećenjima jetre i bubrega, te istovremena primjena sa brabituratima, fenilbutazonom i drugim NSAIL.

Ne treba ga koristiti kod bolesti hematopoetskog sistema, hroničnih gastrointestinalnih ulkusa, bronhijalnog spazma i zatajenja bubrega.

SIMPTOMI PREDUZIRANJA, MJERE PREDOSTROŽNOSTI I PROTIOTROVI:

U toksičnim dozama može doći do prekomjernog pada krvnog tlaka, kome, šoka, konvulzija, zastoja disanja, krvarenja, oštećenja bubrega i jetre. Primjenjuje se simptomatsko i suportivno lijeчењe.

UPOZORENJA ZA NECILJANE VRSTE:

Ne preporučuje se njegova upotreba kod mačaka jer može izazvati uzbuđenje i lučenje sline.

KARENCA:

Meso i jestivi organi goveda: 12 dana,

konji (intravenozno davanje): 5 dana,

Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi

OPŠTE NAPOMENE:

Prije upotrebe i u slučaju neočekivanih efekata posavetujte se sa svojim veterinarom. Čuvati izvan dohvata djece.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA:

Treba ga čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne treba ga stavljati u frižider i ne smije se zamrzavati. Čuvati u kutiji, zaštićeno od svjetlosti.

Rok trajanja je 3 godine od datuma proizvodnje.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA VETERINARE KOJI PRIMJENJUJU LIJEK:

Osobe za koje se zna da su preosjetljive na metamizol treba da budu oprezne pri kontaktu sa proizvodom i u slučaju kontakta sa kožom, oprati se sa puno vode.

PAKOVANJE:

Staklene boce, boje meda koje sadrže 50 i 100 ml rastvora, u kartonskim kutijama.

UPOZORENJE ZA ODLAGANJA I NE CILJANE VRSTE:

Prazne ili neiskorištene lijekove i ambalažu treba odložiti u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

NAČIN IZDAVANJA: Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE: Primjenu lijeka može vršiti samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar (*“ad manum veterinarii”*)

MJESTO PROIZVODNJE:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

UVOLNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

TERRAVET DOO, ul.Sarajevska bb. Gradačac, Bosna i Hercegovina, Tele/fax: 035-819-523

BROJ I DATUM ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U BIH

UP-I-06-2-20/21-411/22 J.B; od 23. maja 2022. godine