

MICOSPECTONE
50 mg/ml + 100 mg/ml, injekcioni rastvor za goveda i svinje
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV u 1 ml:

Linkomicin	50 mg
(što odgovara linkomicin hlorhidrata	56,7 mg)
Spektinomicin	100 mg
(što odgovara spektinomicin hidrohlorida	150 mg)
Nosač: benzoatni alkohol (E1519) 10 mg, natrijum metabisolfito (E223) 1,5 mg	

DJELOVANJE

Micospectone je sastavljen od dva antibiotika i to linkomicina (antibiotik iz familije linkozamine) i spektinomicina (antibiotik aminociklitolitik), u odnosu 1:2. oba antibiotika spriječavaju razvoj bakterija.

Antibiotik linkomicin ispoljava svoje negativno dejstvo na gram + bakterije i mikoplazme.

Antibiotik spektinomicin ispoljava svoje negativno dejstvo na gram – bakterije i vrlo mali broj gram + bakterija i mikoplazmi. Nakon aplikacije lijek se u organizmu za vrlo kratak period nađe u organima životinja. Eliminacija viška antibiotika linkomicina vrši se hepatobilijarno, a vrlo male koncentracije se izbacuju i putem mokraće. Neiskorišteni dio spektinomicina se izbacuje putem urina.

INDIKACIJE

Micospectone se koristi kod svih infekcija izazvanih gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterijama i mikoplazmama koje su osjetljive na linkomicin i spektinomicin. Najbolje je lijek primjeniti nakon testa osjetljivosti (antibiograma). Naročito se koristi kod infekcija koje su izazvane sljedećim mikroorganizmima: *Bacilli*, *Bordetelle*, *Campylobacter*, *Clostridia*, *Coliformi*, *Coccidi*, *Corynebatterii*, *Diplococci*, *Emofili*, *Fusobacterium spp*, *Klebsiellae*, *Leptospirae*, *Pasteurellae*, *Salmonellae*, *Stafilococci*, *Streptococci*, *Treponemae*, *Micoplasmae*.

Goveda: bolesti respiratornog trakta, enteritis, artritis, mastitis, klostridioze, mikoplazmoze,

Svinje: upale pluća (*Haemophilus spp.*), hemoragična dizenterija, artritis, bakterijski enteritis,

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se koristi samo kod vrsta životinja za koje je namjenjen.

Lijek se ne smije koristiti kod životinja koje su osjetljive na antibiotike linkomicin i spektinomicin.

Lijek se ne smije koristiti kod konja, kunića i koka nosilja.

Ne koristiti ga istovremeno sa eritromicinom (zbog kontraindikacija sa linkomicinom).

Lijek e ne smije koristiti sa miorelaksatorima.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Proizvod se može aplicirati duboko intramuskularno u sljedećim dozama:

Goveda: 1 ml / 10 kg tjelesne mase (što odgovara 5 mg linkomicina/kg žive mase i 10 mg spektinomicina / kg tjelesne mase dnevno) svakih 12-24 h tokom 2-4 dana

Svinje: 1 ml / 10 kg tjelesne mase (što odgovara 5 mg linkomicina/kg tjelesne mase i 10 mg spektinomicina / kg tjelesne mase dnevno) svaka 24 sata tokom 3-7 dana.

Za pravilno doziranje, prije upotrebe lijeka procijeniti težinu životinje, kako bi se izbjegao predoziranje lijeka.

Ukoliko se injicira veća količina lijeka kod krupnih životinja, injiciranje obaviti na više tačaka, uz blago masiranje nakon aplikacije.

NUSPOJAVE

Kod svinja su uočene rijetke pojave dijareje, prolaznog tipa. Mogu se uočiti i reakcije tkiva na mjestu uboda injekcije (otok i crvenilo).

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Lijek se ne smije aplicirati sa ostalim antibioticima.

Obratiti posebnu pažnju ukoliko se koristi sa miorelaksantima (neuroblokatorima).

KARENCA

Goveda: Meso i organi: 20 dana; Mlijeko: 72 sata (6 muža)

Svinje: Meso i organi 20 dana.

NAČIN IZDAVANJA:

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE:

Lijek mogu primjeniti samo doktori veterinarske medicine/diplomirani veterinari („Ad manum veterinarii“)

NAČIN ČUVANJA

Lijek se čuva na hladnom, prozračnom i tamnom mjestu (do 25°C). Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

3 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora utrošiti u roku od 28 dana.

PAKOVANJE: 50 ml bočica, 100 ml bočica, 250 ml bočica

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-2686/22 J.B; od 21. novembra 2022. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a.**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy – Casella Postale/P.O. box 2

UVOZNIK I DISTRIBUTER: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje**, VIII ulica br. 57, 76270 Orašje, BiH

Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com