

**Nobilis Salenvac ETC**, injekciona suspenzija za kokoši, 1000 doza  
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Intervet International B.V.  
Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija  
Podnosilac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH  
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

## IME LIJEKA

Nobilis Salenvac ETC

## KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 0,5 ml sadrži:

Aktivna tvar:

Inaktivirana Salmonella Enteritidis, soj PT 4

Inaktivirana Salmonella Typhimurium, soj DTI 04

Inaktivirana Salmonella Infantis, soj A, S03499-06

Adjuvans:

Aluminijum hidroksid

Pomoćne tvari:

Tiomersal

## INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svih uzgojnih kategorija kokoši, osim brojlera, a radi smanjenja kolonizacije i fekalnog izlučivanja bakterija *S. Enteritidis* (serogrupa D), *S. Typhimurium* i *S. Heidelberg* (serogrupa B), *S. Infantis*, *S. Hadar* i *S. Virchow* (serogrupa C).

Početak imuniteta: 4 sedmice nakon druge primjene.

Trajanje imuniteta: 90 sedmica nakon druge primjene.

## KONTRAINDIKACIJE

Ne davati nosilicama koje se nalaze 3 sedmice prije početka nošenja.

## NEŽELJENA DEJSTVA

Vakcinacija vrlo često može dovesti do pojave malih (do 8 mm) i prolaznih opipljivih čvorića na mjestu ubrizgavanja. Čvorići se u potpunosti povlače u roku od 2 sedmice nakon druge vakcinacije.

### **Upotreba tokom gravidnosti i laktacije**

Ne davati nosilicama koje se nalaze 3 sedmice prije početka nošenja.

O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu, potrebno je odmah obavijestiti nadležnog veterinaru u skladu s članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Sl. Novine FBiH" br. 15/98 i 70/08).

## CILJNE VRSTE

Kokoši.

## DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Prije upotrebe dobro protresti. Šprice i igle moraju biti sterilne prije upotrebe. Slijediti standardne aseptičke postupke.

Intramuskulamo ubrizgavanje jedne doze od 0,5 ml u dobi od 6 sedmica starosti, nakon čega slijedi druga vakcinacija jednom dozom od 0,5 ml najmanje 4 sedmice kasnije. Drugu vakcinaciju treba provesti najkasnije do 3 sedmice prije početka nošenja.

Higijenske mjere i dobra uzgojna praksa takođe trebaju biti važan dio programa suzbijanja bolesti kako bi se smanjila učestalost infekcije Salmonelom

## KARENCA

Nula dana.

## POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati u hladnjaku. Čuvati van dohvata i pogleda djece.  
Ne zamrzavati. Zaštititi od svjetla. Samo za veterinarsku upotrebu.  
Rok trajanja nakon prvog otvaranja bocice: 10 sati.

## POSEBNA UPOZORENJA

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Ako dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah tražiti pomoć ljekara i pokazati letak iz pakovanja ili naljepnicu.

Ne davati nosilicama 3 sedmice prije pronošnja.

Nisu dostupne nikakve informacije o sigurnosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima. Stoga odluku o korištenju ove vakcine prije ili nakon nekog drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donijeti pojedinačno, od slučaja do slučaja.

Ne miješati sa drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

## POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

## BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-20/21- 2357/20 J.B; od 20. januara 2021. godine

## OSTALI PODACI

**Pakovanje:** Kutija sa 1x1000 doza vakcine (500 ml).

**Rok upotrebe:**

Rok trajanja veterinarsko-medicinskog proizvoda upakovanog za prodaju: 2 godine.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja bočice: 10 sati.

**Način izdavanja:** Na veterinarski recept. Aplikaciju vakcine mogu vršiti samo diplomirani veterinari ili dr vet.med.

**ATCvet kod:** QI01AB01

## NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

MSD A.H, Intervet International R.V.; Wim de Körverstraat 35; 5831 AN Boxmeer; Holandija.

## NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina