

OTOPET TERAPIA
Kapi za uši za pse i mačke
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV u 1 ml:

Rifaksimín	10 mg
Kolistín sulfat	200.000 IU
Miconazol	17,4 mg
Corbaryl	10 mg
Triamcinolon	0,908 mg
(što odgovara triamcinolon acetónid 1 mg)	
Nosača (sterilna voda i dr.) do 1 ml	

DJELOVANJE

OTOPET TERAPIA je uljna suspenzija koja se koristi za liječenje svih infekcija ušnog kanala kod pasa i mački izazvane bakterijama, gljivicama i infestacija krpeljima i drugim parazitima. Lijek sadrži u svom sastavu antibiotike rifaksimín i colistin koji ispoljavaju svoje baktericidno dejstvo na široki spektar gram + i gram – bakterija (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *E.coli*, i td.).

Mikonazol je antimikotik koji spriječava razvoj mikoza djelujući na ćelijsku membranu čineći je propustljivijom i samim tim uništava u potpunosti. Naročito je efikasan protiv sljedećih gljivica: *Malassezia pachydermatis* i *Candida spp*, kao i negativno djelovanje na gram + bakterije.

Corbaryl je antiparazitik koji djeluje na nervni sistem parazita i inhibiše razvoj enzima acetilkolinesteraze. Efikasan je protiv *Otodectes cynotis*, koji je odgovoran za parazitalne otitise kod pasa i mačaka.

Triamcinolon acetónid je kortikosteroid, koji ima jak antiinflamatorni efekat samo kada se koristi spolja (ušna školjka). Istovremeno i inhibira pojavu svraba kod svih ušnih infekcija, a time i djeluje smirujuće na životinju.

INDIKACIJE

OTOPET TERAPIA se koristi kod svih spoljašnjih otitisa kod pasa i mačaka (infekcije i infestacije) izazvanih gram + i gram – bakterijama, krpeljima, parazitima, gljivicama i td.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne smije koristiti kod pasa i mačaka čije je bubna opna (*membrana timpanika*) mehanički oštećena (perforacije).

Ne koristi u slučaju preosjetljivosti na aktivne supstance lijeka.

Ne koristiti istovremeno sa tvarima za koje je poznato da su ototoksične.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Prije upotrebe provjeriti da nije oštećena bubna pona. Lijek se dobro promućka i mehanički očisti spoljna ušna školjka a potom i ušni kanal. Nakon mehaničkog čišćenja, ubaciti 1-2 ml otopet lijeka u aurikolarni kanal i nakon toga izvršiti masažu ušne školjke kako bi lijek prodro što dublje.

Tretman ponoviti najmanje dva puta u toku dana, tokom 7-10 dana.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacija BiH“ br. 15/98 i 70/08).

POSEBNA UPOZORENJA

Bakterijska upala ušiju i ona izazvana gljivicama je često sekundarne prirode, te je stoga potrebna pažljiva dijagnoza da bi se utvrdio primarni uzrok upale.

Posebne mjere korištenja za životinje

U slučaju preosjetljivosti na bilo koji od sastojaka , treba odmah prekinuti terapiju sa ovim lijekom i primjeniti drugo odgovarajuću terapiju. Primjena ovog lijeka se mora zasnivati na identifikaciji uzročnika upale (antibiogram). Upotreba lijeka koja nije u skladu sa ovim Uputstvo može izazvati pojavu premoći bakterija i gljivica koje su otporne na aktivne supstance i smanjiti efikasnost lijeka. Prije upotrebe lijeka treba pažljivo pregledati ušni kanal i školjku da se utvrdi da nije došlo do perforacije bubne opne, da se upala ne prenese u srednje i unutrašnje uho, a time i oštećenje sluha.

Posebne mjere za osobe koje primjenjuju lijek

Tokom primjene lijeka savjetuje se korištenje zaštitnih rukavica da bi se izbjeglo da onaj ko primjenjuje lijek dođe u kontakt sa cabarylom koji može biti toksičan ukoliko prodre u kožu. U slučaju notičnog kontakta sa kožu, potrebno dobro isprati vodom. Izbjegavati kontakt sa očima i ustima, a ukoliko do toga dođe, isprati dobro vodom i kontaktirati ljekara, uz pokaz ovog Uputstva.

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Lijek se ne smije koristi u asocijaciju sa ostalim antibioticima.

KARENCIJA:

Ne postoji

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Lijek se čuva na hladnom, prozračnom i tamnom mjestu. Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

2 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora potrošiti u roku od 6 mjeseci.

PAKOVANJE

25 ml bočica

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, ambalaža, ostaci lijeka i istekli lijekovi se moraju ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-2688/22 J.B, od 21. 11. 2022. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy
– Casella Postale/P.O. box 2

UVOZNIK I DISTRIBUTER: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje**, VIII ulica br. 57, 76270
Orašje, BiH

Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com