

**Polivermin-L bolusi**  
goveda, ovce, koze

Za upotrebu u veterinarstvu

## **Naziv lijeka**

Polivermin-L bolusi  
goveda, ovce, koze  
Samo za upotrebu u veterinarstvu

## **Sastav**

### **Aktivna supstanca**

#### **1 bolus sadrži :**

Oksiklozanid        600mg  
Levamizol hidrohlorid        300mg  
Pomoćne tvari: Starlac (laktoza monohidrat 85% i kukuruzni škrob 15%) 1880mg, povidon 50mg,  
magnezijev stearat 40mg, koloidalni silicijev dioksid 30mg

## **Indikacije**

Za tretman i prevenciju hronične metiljavosti (fascioloza) i paramfistomoze, želudačno-crijevnih i infekcija plućnih nematoda kod goveda, ovaca, koza.

Suzbija zrele i nezrele oblike nematoda.

Ovaj proizvod efikasan je protiv slijedećih parazita:

Praktično suzbija sve metilje (*Fasciola spp.*) koje se nalaze u žučnom kanalu jetre. Uništava zrele oblike *Paramfistomotosum spp.*

U sirištu: *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus spp.*

U crijevima: *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Oesphagostomum*, *Chabertia* i *Bonostomum spp.*

U plućima: *Dictyocaulus spp.*

Kod goveda djelotvorno suzbija razvojne i odrasle stadije *Ostertagia*, te je učinkovita u liječenju ostertagioze (tip II). Nije efikasan kod inhibicije larvi *Ostertagie* (ostertagioza pred-tip II) koja zahtjeva ponavljanje liječenja.

Kod ovaca je učinkovit protiv inhibiranih/imobiliziranih larvi *Haemonchus*, *Ostertagia* i *Trichostrongylus axei*.

Levamizol se daje kao imunostimulans za jačanje imune odbrane protiv virusnih infekcija i hronične recidivne bolesti.

Efikasan je alternativni tretman u slučajevima razvijene rezistencije na druge hemijske nevezane antihlemintike.

## **Kontraindikacije**

Ne smije se koristiti u kombinaciji sa spojevima fosfora i njihovom aplikacijom 14 dana prije i poslije aplikacije Polivermina L.

Međutim, životinje se mogu istovremeno tretirati sa fosfornim dresinzima za liječenje tumornih formacija ličinke tipa *Oestridae*, samo ako one sadrže jedan od sastojaka: fosmet, fention, metrifonat.

Ne davati sa finotiazin metilpiridinom i prokainom; životnjama sa ozbiljnim bubrežnim ili jetrenim problemima; te kod oslabljenih/isrpljenih životinja.

Ne koristiti kod životinja sa osjetljivošću na aktivni sastojak.

## **Neželjene reakcije**

Veoma rijetke.

Veoma rijetko kod normalnog doziranja oksiklozanida kod goveda može doći do omekšanja fecesa i prolaznog gubitka apetita.

Nema sporednih efekata kod normalnog doziranja levamizola.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH"br. 15/98 i 70/08)

### **Ciljane vrste**

Goveda, ovce, koze

### **Doziranje za svaku vrstu, put i metod administracije**

Daje se oralno, direktno i pojedinačno svakoj životinji u dozi:

1 bolus (600mg oksiklozanida i levamizol hidrohlorida 300mg) na 40kg tjelesne mase , što odgovara oksiklozanidu 15mg/kg.t.m. i levamizol hidrohlorid 7,5mg/kg. t.m.

### **Karenca**

Meso i iznutrice- 28 dana

Životinje za ljudsku ishranu se mogu klati nakon 28 dana nakon posljednje aplikacije lijeka.  
Ne koristiti na životnjama čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

### **Specijalna upozorenja za čuvanje**

Držati van dosega djece.

Držati na temperaturi do 25°C.

Držati na suhom mjestu.

Držati na mjestu zaštićenom od direktnе svjetlosti.

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju EXP.

Rok trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

### **Specijalna upozorenja**

Specijalna upozorenja za osobe koje daju veterinarsko medicinski proizvod životnjama.

Osobe sa poznatom osjetljivošću na levamizol hlorid/ oksiklozanid trebaju izbjegavati kontakt sa proizvodom i administrirati proizvod sa oprezom.

### Korištenje tokom graviditeta

Može se primjeniti tokom graviditeta

### Korištenje tokom laktacije

Može se primjeniti u periodu laktacije

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i druge forme interakcije

Dostupni podaci pokazuju da ovaj proizvod ne bi trebalo davati zajedno sa fosfoorganskim komponentama i dietilkarbamazinom sa fenotiazinom, metpiridinom i prokainom.

Predoziranje (simptomi, hitne procedure, protuotrovi), ukoliko je potrebno:

Predoziranje može uzrokovati tromost, omekšanje fecesa kod ovaca i moguću dijareju, anoreksiju i mahanje glavom, blagi tremor mišića, gubitak težine kod goveda.

Ovi efekti su povećani kod životinja sa teškim oštećenjem jetre i/ili dehidracijom tokom liječenja.

Ukoliko je potrebno kao protuotrov može se upotrijebiti atropin.

### Inkompatibilnost

U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima

### **Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :**

Lijek ili njegove ostatke ne bi trebalo odlagati u kućni otpad ili otpadne vode.

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

## **Druge informacije**

### **Djelovanje**

POLIVERMIN L bolusi imaju širok spektar djelovanja. Djeluju protiv zrelih stadija velikog metilja, larvalnih i adultnih oblika želučano-crijevnih i plućnih nematoda te članaka trakovica roda Moniezia. U metiljima oksiklozanid prekida reakcije oksidativne fosforilacije i djeluje fasciolicidno, a levamizol u valjkastim crvima i plućnim vlascima remeti neuromuskularni prijenos podražaja uzrokujući spastičnu paralizu mišića.

### **Način izdavanja**

Lijek se izdaje na veterinarski recept.

### **Pakovanje**

Kutija sa 30 bolusa.

### **Proizvođač**

Golashpharma Ltd Bulgaria , Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Konstendil, Bugarska. tel:  
+359 888 300 755

### **Uvoznik za BiH**

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica , Bosna i Hercegovina  
tel: 032/423-196; fax: 032/423-194

### **Broj i datum odobrenja :**

UP-I-06-2-20/21-631/22 J.B; od 04. oktobra 2022. godine