

VILMECTİN-MAX
Injekciona otopina
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml injekcione otopine sadrži:
Ivermektina 20 mg

OBLIK

Injekciona otopina

INDIKACIJE

Lijek posjeduje veoma širok spektar djelovanja, na ekto i endo parazite goveda i ovaca. Koristi se za kontrolu i borbu protiv unutrašnjih i vanjskih parazita kod goveda i ovaca I to:

Kod goveda

Gastro-intestinalne nemadote: *Heamonchus placei*, *Ostertagia spp.*, *O.ostertagi* (odrasle larve, larve u fazi odrastanja, hipobiotičke larve), *O.lyrate* (odrasle, L₄ larve), *Mecistocirrus digitatus* (odrasle), *Trichostrongylus axei*, *T.colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *C.punctata*, *C.pectinata*, *Cooperia sp.*, *Nematodirus helveticus* (odrasle), *N.spathiger* (odrasle), *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosum* (odrasle), *Bunostomum phlebotumum*, *Toxacara vitulorum*.

Plućni vlasti: *Dictyocaulus viviparus*

Uzročnik filarioze kože: *Parafilaria bovicola*

Očne Nematode: *Thelezia sp.* (ergin)

Paraziti kože: *Hypoderma bovis* (larva), *Hypoderma lineatum* (larva), Miyasis faktori: *Dermatobia hominis* (larva)

Larve na ranama (parazitski period): *Chrysomya bezziana*, *Cochliomyia hominivorax*

Uzročnici šuge: *Psoroptes communis bovis*, *Psoroptes communis ovis*, *Sarcoptes scabiei bovis*, *Chorioptes bovis*

Vaške: *Linognathus vituli*, *Haematophinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinia bovis*

Krpelji: *Boophilus spp.*, *Ornithodorus savignyi*

Kod ovaca

Gastro-intestinalne nematode: *Heamonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides papillosum*, *Chaberthia ovina*, *Trichuris ovis*

Plućni vlasti: *Dictyocaulus filaria*

Uzročnici šuge: *Sarcoptes scabiei var. Ovis*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis var. ovis*

Vaške: *Bovicola ovis*, *Linognathus pedalis*, *L.ovillus*, *L.stenopsis*

Paraziti ovčije vune: *Melophaga ovinus*

Nosni paraziti/crvi : *Oestrus ovis*

Parazitske larve na ranama: *Chrysomia bezziani*

Krpelji: *Boophilus sp.*, *Ornithodorus lahorensis*

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindicirana je upotreba tokom migracije ličinki goveđeg štrka (*Hypoderma bovis*) u periodu od decembra do marta, jer može doći do ugibanja ličinki u kičmenom kanalu (što rezultira u nastanku paraliza ili pareza) ili u zidu jednjaka (što se očituje u salivaciji i nadamu).

Ne smije se davati životinjama tokom prva tri mjeseca graviditeta, kravama 60 dana prije telenja, a ovcama 28 dana prije jagnjenja.

Ne davati intravenozno.

NEŽELJENI EFEKTI

Može doći do privremenog bola i oteklina na mjestu uboda.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

DOZIRANJE I PRIMJENA

Vilmectin Max injekciona otopina, kod ovaca i goveda se primjenjuje intramuskularno i podkožnim ubrizgavanjem. Tretiranje kod goveda je u predjelu vrata na opuštenu kožu ili u predjelu iza lopatice, kod ovaca u kožni nabor ispod ili iza lopatice ubrizgavanjem injekcije u opušteno tkivo. Tretiranje obaviti u skladu sa pravilima asepse i antisepse suhom i sterilnom iglom i špricom.

Goveda ili kod ovaca: 0.2 mg ivermektin/kg tjelesne mase, tretira se na 100 kg/1 ml tjelesne mase, intramuskularno i potkožno.

Tabela praktičnog doziranja:

OVCE		GOVEDA	
Tjelesna masa (kg)	Doza (ml)	Tjelesna masa (kg)	Doza (ml)
20-25	0.25	50-100	0.5-1
25-50	0.5	100-200	1-2
50-75	0.5 - 0.7	200-400	2-4

KARENCIJA:

Meso ovaca nakon posljednje primjene lijeka- 42 dana, meso goveda nakon posljednje primjene lijeka - 35 dana,

Lijek se ne koristi kod goveda i ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 2 god od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti. Skladištite na temperaturi (15-25°C)

SIMPTOMI PREDIZIRANJA I MJERE OPREZA

Ima široku granicu tolerancije (tele-janjenajviše 5 puta, odrasli 10-20 puta). U predoziranju, midrijaza, depresije različitog stepena, opušteni mišići,pareza, ataksija, plikovi na jeziku i usnama, povećano slinjenje, polijeganje cijelom dužinom, ponašanje kao u komi vezano za centralni nervni sistem. Nema poznatog antidota.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIJAU

Kada se radi sa lijekom izbjegavati jedenje,pijenje ili pušenje.

Izbjegavajte kontakt sa lijekom, nakon upotrebe isprati ruke.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („Ad manum veterinari“)

PAKOVANJE

Kartonske kutije sa bočicama od 20, 50,100 i 250 ml.

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.
Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA
Tel: 03128271840

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina Tel/fax:
035/819-523

BROJ I DATUM ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U BiH

UP-I-06-2-20/21-29/22, od 14. juna 2022. godine