

VIODOX
Antibakterijski sprej za kožu
za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV:

Svaki 60 ml tamnoplave-ljubičaste otopine, sadrži 1,26 grama doksiciklin hiklata (boćica od 200 ml sa 120 ml – 2,52 g doksiciklin hiklata; boćica od 300 ml sa 180 ml – 3,78 g doksiciklin hiklata; boćica od 500 ml sa 300 ml – 6,30 g doksiciklin hiklata).

DJELOVANJE:

Doksiciklin je antibakterijski lijek širokog spektra koji pripada grupi tetraciklina. Djeluje na mnoge gram pozitivne i gram negativne bakterije. Doksiciklin djeluje lokalno, jer se pri vanjskoj primjeni ne apsorbira kroz kožu.

INDIKACIJE:

Koristi se za lokalnu upotrebnu kod infekcija kože (osim mlječne žlijezde), papaka, noktiju i ozljeda uzrokovanih bakterijama osjetljivim na doksiciklin.

CILJANE VRSTE:

Goveda, konji, ovce, koze, svinje, psi i mačke.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Nakon što je područje na koje se nanosi potpuno očišćeno, sprej se nanosi prskanjem u trajanju od 1-2 sekunde na inficirano područje sa udaljenosti od 15-20 cm. Tretira se 1 do 2 puta na dan, unajduže 5 – 7 dana, ili kraće ako dođe do izlječenja. Prije upotrebe treba promućati. Koristi se samo za lokalnu primjenu.

POSEBNE KLINIČKE INFORMACIJE I UPOZORENJA ZA CILJNE VRSTE:

Prije upotrebe promućati. Treba poduzeti mjere opreza kako životinja ne bi lizala tretirano područje.

Upotreba tokom graviditeta je bezbjedna.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Kod preosjetljivih životinja može se uočiti prolazna lokalna osjetljivost.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH"br. 15/98 i 70/08

INTERAKCIJE LIJEKOVA:

Ne koristiti zajedno sa pencilinima, cefalosporinima i kinolonima.

SIMPTOMI PREDUZIRANJA, MJERE PREDOSTROŽNOSTI I PROTIOTROVI:

U slučaju predoziranja može se primijetiti lokalna osjetljivost.

KARENCA:

Meso, jestivi organi goveda, konja, ovaca, koza i svinje „0“ dana.

Mlijeko goveda, konja, ovaca i koza: „0“ dana.

Lijek se ne smije upotrebljavati na vimenu muznih životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne smije se koristiti kod životinja za koje je poznato da su preosjetljive na tetracikline.
Ne nanositi na oči. Prskati podalje od sluzokože.

OPŠTE NAPOMENE:

Čuvati izvan dohvata djece.

U slučaju neočekivanih efekata pri upotrebi kontaktirati doktora veterinarske medicine.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA VETERINARE KOJI APLICIRAJU LIJEK:

Ako korisnik slučajno dođe u kontakt sa sprejom, područje treba oprati sa puno vode. U slučaju alergijske reakcije potrebno je konsultovati najbližu zdravstvenu ustanovu i bocu od spreja pokazati doktoru. Pošto je zapaljiv, nemojte pušiti tokom nanošenja. Ne prskati prema vatri ili vrućim predmetima.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA:

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, ne stavljati u frižider i ne izlagati dejstvu svjetla. Čuvati dalje od izvora toplote i zapaljivih materijala. Rok trajanja 2 godine od datuma proizvodnje.

UPOZORENJE ZA ODLAGANJA I NE CILJANE VRSTE:

Prazne ili neiskorištene kutije za lijekove treba odložiti u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03), ali nakon što se potpuno isprazne. Prazne kutije ne treba bacati u vatru ili nasilno otvarati.

KOMERCIJALNA PREZENTACIJA:

U prodaji se nudi u metalnim bocama od 200, 300 i 500 ml.

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

MJESTO PROIZVODNJE:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

UVOZNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

TERRAVET DOO, ul.Sarajevska bb. Gradačac, Bosna i Hercegovina, Tele/fax: 035-819-523

BROJ I DATUM ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U BIH

UP-I-06-2-20/21-166/22 J.B; od 18. maja 2022. godine



Oprez zapaljivo