

Broadline spot on otopina za macke <2,5 kg
Broadline spot on otopina za macke 2,5 kg-7,5 kg

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Svaki aplikator sadrži jedinicnu dozu u kolicini:

BROADLINE spot on otopina	Volumen otopine jedinicne doze (ml)	Fipronil (mg)	S- Metopren (mg)	Eprinomektin (mg)	Prazikvantel (mg)
macke <2,5 kg	0,3	24,9	30,00	1,20	24,9
macke 2,5 kg-7,5 kg	0,9	74,7	90,00	3,60	74,7

Pomocne tvari: Butilhidroksitoluen (E321)1 mg /ml.

INDIKACIJE

Za macke invadirane ili u opasnosti od invazije razlicitim trakavicama, oblicima i ektoparazitima. Veterinarsko medicinski proizvod je osobito indiciran kad su zivotinje invadirane sa sve tri skupine parazita.

Ektoparaziti

- Lijecenje i prevencija infestacije buhama (Ctenocephalides felis). Unistavanje buha u roku 24 sata. Jedan tretman sprjecava daljnju infestiranost tokom najmanje mjesec dana.
- Prevencija kontaminacije razvojnim oblicima buha (jaja, licinki i kukuljica buha) u okolisu tokom razdoblja duzeg od mjesec dana.
- Proizvod se može koristiti kako bi sprjedio nastanak alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD)
- Lijecenje i prevencija infestacije krpeljima (Ixodes ricinus). Unistavanje krpelja u roku 48 sati. Jedna primjena sprjecava dalju infestiranost tokom razdoblja od cetiri sedmice.
- Prevencija dilofilarioze (Dirofilaria immitis) treba poceti unutar
- mjesec dana nakon prve očekivane izloženosti komarcima.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod bolesnih ili konvalescentnih životinja.

Ne koristiti za zečeve.

Ne koristiti u slučajevima preosjetljivosti na aktivne tvari ili neku od pomoćnih tvari.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

- Koristiti aplikator velicine prilagođene tezini macke
- Koristiti makaze za rezanje blistera uz tackastu liniju, a zatim odvojiti poklopac
- Ukloniti aplikator iz paketa i drzati ga uspravno
- Kratkotrajno povuci, okrenuti i maknuti poklopac
- Krzno na srednjem području vrata, izmedju baze, lubanje i lopatice rasiriti dok koža ne bude vidljiva
- Staviti vrh aplikatora na kožu i nanijeti cijeli sadržaj izravno na kožu na jednom mjestu.
- U dugodlakih pasmina posebnu pozornost treba posvetiti primjeni proizvoda na kožu a ne na dlaku čime se osigurava optimalna učinkovitost

KARENCIJA

Nije primjenljivo

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Drzati izvan dosega djece, čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svjetla

Ne koristiti VMP poslije isterka rola valjanosti naznačenog na kutiji.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU OD CILJNIH VRSTA

Spriječiti međusobno lizanje životinja neposredno nakon aplikacije.

Nakon aplikacije krpelji će biti ubijeni unutar 48 sati po infestaciji bez mogućnosti konzumiranja krvnog obroka.

Kako je moguća pojedinačna infestacija krpeljima i nakon primjene ne može se u potpunosti isključiti prenos zaraznih bolesti.

Iako uticaj čestog šamponiranja i uranjanja u vodu nije ispitana isti bi trebalo izbjegavati. Kratak dodir životinje s vodom nakon mjeseca od primjene neće uticati na učinkovitost proizvoda.

Međutim kao mjera predostrožnosti nije preporučljivo kupati životinje unutar dva dana nakon aplikacije.

Opornost parazita na bilo koju skupinu antiparazitika se može razviti nakon ceste upotrebe proizvoda iz iste skupine. Epidemiološki podaci o trenutnoj osjetljivosti ciljnih vrsta treba uzeti u obzir kako bi se smanjila mogućnost pojave rezistencije u buducnosti.

Macke u endemskim područjima sa dirofilariozom ili one koje su putovale u endemska područja mogu biti invadirane odraslim dirofilarijama.

Iako se VMP može sigurno primjeniti na mačkama invadiranim odraslim dirofilarijama, ne postoje dokazi o ljekovitom učinku. Stoga se preporучuje da se sve macke u dobi od 6 mjeseci ili starije a žive u endenskim područjima za dirofilariozu, testiraju na prisustvo odraslih oblika dirofilarija *immitis*, prije nego što se primjeni VMP.

POSEBNE MJERE OPREZA ZA UPOTREBU KOD ŽIVOTINJA

Samo za primjenu nakapavanjem. Ne ubrizgavati, ne davati oralnim niti nekim drugim putem. Izbjegavati kontakt s očima mačke.

Važno je primijeniti veterinarski lijek na područje kože gdje ga mačka ne može ukloniti lizanjem: na vrat, između ramena. Sprječiti međusobno lizanje mačaka nakon tretmana.

Koristi se isključivo kao spot on pripravak. Ne smije se ubrizgavati, davati u usta ili primjenjivati na bilo koji drugi način. Izbjegavati dodir sa očima mačke. Ehinokokoza predstavlja opasnost za ljudе i prijavljuje se Svjetskoj organizaciji za zaštitu životinja (OIE).

NUSPOJAVE (učestalost i ozbiljnost)

Privremeno skupljanje ili ukočenost dlake i blage i prolazne kožne reakcije na mjestu primjene (svrbež, gubitak dlake) često su evidentirane na mjestu primjene nakon tretmana u kliničkim studijama.

Privremena prekomjerna salivacija često je uočena nakon lizanja mesta primjene nakon tretmana u kliničkim ispitivanjima.

Poremećaji probavnog trakta i/ili neurološki poremećaji mogu nastati nakon slučajnog oralnog unosa veterinarskog lijeka . Prolazno sljepilo ili oslabljen vid uočeni su u veoma rijetkim slučajevima na osnovu iskustva sa sigurnosti nakon stavljanja u promet.

Simptomatsko liječenje može biti potrebno ako se znakovi ne povuku spontano u roku od 24 sata. Ispravna primjena smanjit će mogućnost takvih nuspojava (vidjeti odjeljak 4.9).

Učestalost nuspojava definira se korištenjem sljedeće konvencije:

- vrlo često (više od 1 od 10 liječenih životinja pokazuje nuspojave)
- često (više od 1 ali manje od 10 životinja od 100 liječenih životinja)
- manje često (više od 1 ali manje od 10 životinja od 1.000 liječenih životinja)
- rijetko (više od 1 ali manje od 10 životinja od 10.000 liječenih životinja)
- vrlo rijetko (manje od 1 životinje od 10.000 liječenih životinja, uključujući izolirane prijave).

PAKOVANJA

Kartonska kutija sa 1,3 ili 4 jedinične doze od 3 ml veličine aplikatora

Kartonska kutija sa 1,3, 4 ili 6 jedinične doze od 0,9 ml veličine aplikatora

Sve veličine pakovanja ne moraju biti na tržištu

Broj i datum rješenja:

BROADLINE S : UP-I-06-2-20/21-2269/20 J.B / 20.01.2021.

BROADLINE L : UP-I-06-2-20/21-2268/20 J.B / 20.01.2021.

PROIZVOĐAČ:

BOEHRINGER INGLHEIML, 29 Avenue, TonyGarnier,

69007 Lyon, Francuska.

ZASTUPNIK:

ARNIKA VETERINA SA d.o.o., IsmeteAlajbegovića-Šerbe 7,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.