

DALMARELIN
Injekcioni rastvor za krave i kuniće
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV u 1 ml

Lecirelin acetat (što odgovara lecirelinu)	25 µg
Nosač: benzilni alkohol (E1519)	20 mg

DJELOVANJE

Dalmarelín je injekcijski rastvor koji sadrži lecirelin, sintetički hormon koji je analog hormonu gonadotropina (GnRH), od kojeg se razlikuje u zamjeni glicina u poziciji 6 sa amino acid d-tert-leucinom, i zamjenom glicina u poziciji 10 sa etilamid grupom. Ove strukturne promjene povećavaju afinitet receptora hipofize rezultirajući povećanjem proizvodnje LH i FSH u plazmi na period od 240 minuta, za razliku od 90 minuta - trajanja prirodnog hormona.

Licerin je visoko potentan ali ne usporava GnRH receptore.

INDIKACIJE

Krave:

- Liječenje folikularnih cisti jajnika
- Indukcija ovulacije u momentu inseminacije, u slučaju pojave kratkog tihog ili produženog tjeranja (patoloških stanja)

Kunići: Samo kod životinja koje ne služe u ishrani ljudi, i to:

- Indukcija ovulacije slučaju poremećaja estrusa.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne smije koristiti kod gravidnih životinja.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Proizvod se aplicira intramuskularno:

Krave:

- Liječenje cisti ovarija: 4 ml.
- Indukcija ovulacije u momentu osjemenjivanja kao i pojačavanje tihih estrusa i njihovo produžavanje: 2 ml

Ženke kunića:

- Indukcija ovulacije: 0,2 ml
- Poboljšanje i povećanje broja oplođenih jajnih stanica 0,3 ml

Lijek se može aplicirati kod ženki kunića, 24 sata odmah nakon poroda - okota.

Oplodnju ili pripust ženke kunića izvršiti odmah nakon aplikacije lijeka.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH"br. 15/98 i 70/08

MJERE OPREZA:

Ovulacija se ne može pokrenuti ako je na jajniku prisutno funkcionalno žuto tijelo.

Igle i šprice se ne smiju sterilizirati alkoholom i drugim dezinficijensima.

Životinje u lošem stanju, bilo zbog bolesti, neadekvatne ishrane ili drugih faktori, mogu slabo reagovati na tretman.

Proizvod treba davati kravama s funkcionalnim jajnicima najmanje 14 dana nakon teljenja zbog odsustva djelovanja hormona hipofize prije tog vremena. Proizvod treba primijeniti najmanje 35 dana nakon porođaja za indukciju ovulacije povezану sa vještačkim osjemenjavanjem. Aplikacija lecirelina možda neće biti tako efikasna kod junica kao kod krava.

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Ne koristiti ga istovremeno sa ostalim lijekovima.

KARENCA

- Meso i iznutrice: 0 dana
- Mlijeko: 0 dana

NAČIN IZDAVANJA:

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE:

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“).

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, mračnom i hladnom prostoru, na temperaturi ispod 25° C.

Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

2 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora potrošiti u roku od 28 dana.

PAKOVANJE

4 ml boćica, 10 ml boćica, 20 ml boćica

POSEBNE MJERE OPREZA ZA OSOBE KOJE DAJU LIJEK

Žene u reproduktivnom periodu ili gravidne žene moraju ovaj lijek davati životnjama uz mjere opreza, jer se lijek pokazao toksičan za fetus pacova. U slučaju da lijek dođe u kontakt sa kožom (lijek se resorbuje i preko nepovrijeđene kože), za osobu koja daje

lijek, savjetuje se da mjesto kontakta odmah ispere vodom i sapunom i potraže liječničku pomoć.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, ostaci lijek, ambalaža i istekli lijekovi moraju se ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-2684/22 J.B, od 21. 11. 2022. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a,** Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy – Casella Postale/P.O. box 2

UVOZNIK I DISTRIBUTER: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje,** VIII ulica br. 57, 76270 Orašje, BiHTel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com