

Gonavet Veyx 50 µg/ml

Injekciona solucija za goveda, svinje i konje

NAZIV VETERINARSKO MEDICINSKOG PROIZVODA

Gonavet Veyx 50 µg/ml injekcionalna solucija za goveda, svinje i konje
gonadorelin [6-D-Phe]

IZJAVA O AKTIVNIM SUPSTANCAMA I DRUGIM SASTOJCIMA

Gonavet Veyx je bistra, bezbojna solucija za injekcije koja sadrži:

1 ml injekcijske solucije sadrži:

Aktivne supstance:

gonadorelin [6-D-Phe] 50 µg

(u obliku 52.4 µg gonadorelin [6-D-Phe]-acetata)

Pomoćne supstance:

Hlorkrezol 1.0 mg

DJELOVANJE

Gonadorelin je sintetski ekvivalent prirodnog gonadotrofin-releasing hormonu (GnRH). Prirodni GnRH je dekapeptid koji se sintetizira u hipotalamusu, a zadaća mu je da u hipofizi stimulira sintezu i oslobođanje folikulostimulirajućeg (FSH) i luteinizirajućeg hormona (LH). Oslobođeni FSH i LH dovode do sazrijevanja folikula i ovulacije u normalnom fiziološkom odnosu. Prema tome, gonadorelin je pogodan za tretman nekih fertilitetnih problema u domaćih životinja (vidi indikacije)

INDIKACIJE

Liječenje poremećaja u plodnosti uzrokovanih promjenama i poremećajima funkcije jajnika kod goveda i konja.

Goveda (junice, krave):

-Indukcija ovulacije u slučaju zakašnjele ovulacije prouzrokovane smanjenjem količine LH

-Stimulacija jajnika tokom puerperijuma počevši od 12. dana nakon partusa

-Ovarijalne ciste (uslijed deficit LH)

Svinje (krmače, nazimice):

-indukcija prašenja, ukoliko je to DVM savjetovao.

Konji (kobile):

-liječenje aciklija ili anestrija uzrokovanih manjkom LH

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod krava sa utvrđenim zrelim tercijarnim folikulom spremnim za ovulaciju.

Ne koristiti tokom zaraznih bolesti i drugih relevantnih zdravstvenih poremećaja.

Ne koristiti u slučajevima poznate preosjetljivosti na aktivnu tvar ili bilo koju pomoćnu tvar.

NEŽELJENE REAKCIJE

Nisu poznate

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

CILJANE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda (krave, junice), svinje (krmače, nazimice), konji (kobile)

DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU, NAČIN I PUT PRIMJENE

Za intramuskularnu ili supkutanu injekciju.

Kod intramuskularne upotrebe, po mogućnosti se preporučuje aplikacija u predjelu vrata. Proizvod je namijenjen za jednokratnu primjenu. Doziranje u ml proizvoda i mikrograma gonadorelina [6-D-Phe] po životinji.

Goveda (krave i junice) intramuskularnom injekcijom:

1,0 - 2,0 ml

(što odgovara 50-100 mikrograma gonadorelina[6-D-Phe])

- Indukcija ovulacije u slučaju odgođene ovulacije zbog nedostatka LH

2,0 ml

- Stimulacija jajnika u puerperalnom periodu od 12. dana nakon partusa

1,0 ml

- Ciste jajnika (zbog nedostatka LH)

2,0 ml

Svinje (krmače i nazimice) intramuskularnom ili supkutanom injekcijom:

0,5 - 1,5 ml

(što odgovara 25-75 mikrograma gonadorelina[6-D-Phe])

-Sinhronizaciju prašenja

Krmače:

0,5 - 1,0 ml

Nazimice:

1,0 - 1,5 ml

Konji (kobile) intramuskularnom injekcijom:

2,0 ml

(što odgovara 100 mikrograma gonadorelina[6-D-Phe])

Gumeni čep boćice može se bezbjedno probušiti do 25 puta. U suprotnom, za boćice od 20 ml i 50 ml treba koristiti automatske šprice ili odgovarajuću iglu za izvlačenje kako bi se izbjeglo pretjerano bušenje zatvarača.

KARENCA

Goveda, svinje, konji

Meso i iznutrice: "0" dana

Goveda, konji

Mlijeko: "0" sati

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE

Čuvati van vida i domaćaja djece.

Čuvati u frižideru (2°C - 8°C). Držite boćicu u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C nakon otvaranja.

Ne smije se koristiti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nakon isteka roka trajanja navedenog na kutiji i naljepnici boćice iza "EXP".

Datum isteka se odnosi na posljednji dan tog mjeseca.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja neposrednog pakovanja: 28 dana.

Kada se kontejner otvorи (je otvoren) po prvi put, koristeći rok trajanja koji je naveden u ovom uputstvu za pakovanje, treba odrediti datum do kada se ostatak proizvoda koji ostane u bočici treba iskoristiti. Ovaj datum odlaganja treba da bude napisan u predviđenom prostoru na etiketi.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere opreza koje trebaju poduzeti osobe koje primjenjuju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama

Primjenu treba obaviti sa oprezom kako bi se izbjeglo slučajno samoubrizgavanje. U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražite savjet liječnika i pokažite mu uputstvo o lijeku ili etiketu. Kako se analozi GnRH mogu apsorbirati kroz kožu, slučajno prolivanje na kožu ili u oči treba temeljito isprati vodom. Veterinarsko-medicinski proizvod ne smiju davati trudnice. Žene u reproduktivnoj dobi trebale bi davati proizvod s oprezom. Osobe s poznatom preosjetljivošću na GnRH trebale bi izbjegavati kontakt sa veterinarsko-medicinskim proizvodom.

Upotreba tokom laktacije

Može se koristiti tokom laktacije.

Interakcija sa drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Sinergistički efekat se javlja u slučaju kombinovane primene sa FSH, posebno u slučaju poremećenog puerperalnog toka. Istovremena primjena humanog ili konjskog horionskog gonadotropina može dovesti do prekomjerne stimulacije jajnika.

Inkompatibilnosti

U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, protuotrovi), ako je potrebno

Nisu poznati.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEKORIŠĆENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IMA

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br. 33/03).

PAKOVANJE

Boćice od 10 ml, 20ml ili 50ml u kartonskoj kutiji

Sva pakovanja ne moraju biti komercijalizovana

NAČIN IZDAVANJA

Lijek ne podliježe izdavanju

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-721/23 J.B; od 11. septembra 2023. godine

PRIMJENA LIJEKA

Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar (*„Ad manum
veterinarii“*)

PROIZVODAČ

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Njemačka

UVOZNIK ZA BIH

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica