

**Nobilis Reo IB G ND**, inaktivna vodeno-uljna vakcina od 1000 doza (500 ml)  
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Intervet International bv  
Adresa: Boxmeer, Holandija  
Podnositac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH  
Adresa: Tešanska 24 A, Sarajevo

**IME LIJEKA**

Nobilis Reo IB G ND

**KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

Aktivna komponenta po dozi:

- IB soj M41: inducira  $\geq 6.0 \log_2$  HI jedinica
- ND klon 30: inducira  $\geq 4.0 \log_2$  HI jedinica po 1/50doze ili sadrži  $\geq 50$  PD<sub>50</sub>
- Gumboro soj D78: inducira  $\geq 14.5 \log_2$  VN jedinica
- Reo virusa, soj 1733 i 2408: inducira  $\geq 7.4 \log_2$  ELISA jedinica.

**INDIKACIJE**

Vakcina se preporuča kao buster vakcina uzgojnog jata kao zaštita na infektivni bronhitis, serotip Massachusetts, zaštitu od oboljenja Newcastle, te za imunizaciju od infekcije Reovirusom i infektivnog oboljenja burse u cilju zaštite potomstva vakcinisanih ptica barem u prvim sedmicama života.

Predloženi program vakcinacije sa Nobilis Reo+IB+G+ND aplicira se oko 16-20 sedmice starosti ali ne manje od 4 sedmice prije očekivanog nošenja jaja. Za optimalni buster efekat, ptice moraju početi sa živom vakcinom protiv infektivnog bronhitisa, oboljenja Newcastle, reovirusne infekcije i infektivnog oboljenja burse.

Najbolji rezultati se postižu ako se vakcinacija sa inaktiviranim virusima desi 6 ili više sedmica nakon primjene žive primovakcinacije ali niti pod kojim uslovima to ne smije biti učinjeno ranije od 4 sedmice od očekivanog nešenja jaja.

Antigeni vakcine su sadržani u emulziji voda u ulju kako bi se pojačala produžena stimulacija imuniteta.

**KONTRAINDIKACIJE**

Nema.

**NEŽELJENE POJAVE**

Reakcije na vakcinaciju - kod zdravih ptica neće biti nikakve kliničke reakcije na vakcinaciju. Nekoliko sedmica nakon vakcinacije može se osjetiti blaga oteklina na mjestu apliciranja. Mogu se javiti i lokalne reakcije tkiva.

O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu, potrebno je odmah obavijestiti nadležnog veterinara u skladu s članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Sl. Novine FBiH" br. 15/98 i 70/08).

## CILJANA VRSTA

Uzgojno jato (prenos imunosti na potomstvo).

## DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Svaka ptica mora primiti 0.5 ml vakcine intramuskularno u čvrsti dio grudnog mišića ili subkutano u donji dio vrata.

### Preporučeni program vakcinacije

Nobilis Reo + IB + G + ND treba dati pticama starosti od oko 16-20 sedmica, ali ne kasnije od 4 sedmice prije očekivanog početka nošenja.

Za optimalnu dovakcinaciju, ptice moraju biti prethodno vakcinisane živim vakcinama protiv zaraznog bronhitisa, Newcastleske bolesti, ptičje reovirusne infekcije i zarazne bolesti burze.

Najbolji rezultati će se postići ako se vakcinacija inaktiviranim vakcinom obavi 6 ili više sedmica nakon primjene žive prethodne vakcine, s tim da se ni u kom slučaju ne smije obaviti prije isteka 4 sedmice od prethodne vakcinacije.

## UPUTA ZA PRAVILNU UPOTREBU

Vakcinisati samo zdrave ptice. Prije upotrebe vakcine, dozvoliti adaptacioni period na sobnu temperaturu. Dobro protresti bočicu prije upotrebe. Koristiti sterilnu opremu za injiciranje. Koristiti ukupan sadržaj, jednom kada se otvori bočica. Ne mješati sa drugi vakcinama. Ako osoba koja aplicira vakciju slučano ubode sebe ili drugog, može doći do lokalne reakcije. Preporučava se savjet ljekara uz naglašavanje da se radi o vakcini u uljnoj emulziji.

## KARENCA

, „0“ dana.

## POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati na temperaturi od 2-8°C i izbjegći zamrzavanje. Otvorene boćice bi se trebale iskoristiti unutar 3 sata od otvaranja.

## POSEBNE MJERE SIGURNOSTI KOJE TREBAJU PREDUZETI LICA KOJA PRIMJENJUJU PROIZVOD

Ukoliko lice koje vrši vakcinaciju slučajno ubrizga vakciju u sebe ili nekog posmatrača, može se javiti lokalna reakcija. Preporučuje se traženje savjeta doktora odmah, pri čemu je potrebno doktora informisati o tome da je vakcina emulzija u obliku voda u ulju.

## POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Postupiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

#### **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-20/21- 514/23 J.B; od 25. august 2023. godine

#### **OSTALI PODACI**

**Pakovanje:** Boca načinjena od stakla, hidrolitičke klase tip II (Ph.Eur.), ili od polietilen-tereftalata (PET). Bočice su zatvorene čepom od nitril gume i zapećaće kodiranom aluminijskom kapicom a sadrže 500 ml, tj. 1000 doza vakcine.

**Rok upotrebe:** 24 mjeseca. Sadržaj otvorene boćice treba utrošiti unutar 3 sata od otvaranja.

**Način izdavanja:** Lijek ne podliježe izdavanju.

**Način primjene:** Lijek može primjenjivati sam doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („*Ad manum veterinarii*“)

**ATCvet kod:** QI01AA16

#### **NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International bv; Boxmeer; Holandija

#### **NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanska 24 A, Sarajevo, BiH.