

NONOVULIN
tablete za pse i mačke
Samo za upotrebu u veterinarstvu

NONOVULIN
tablete za pse i mačke
Samo za upotrebu u veterinarstvu

Sastav

1 tableteta sadrži

Aktivna supstanca:

Megestrol acetat 10 mg

Pomoćne tvari:

Laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, povidon, talk, magnezijum stearat, koloidalni anhidrovani silicij do 200 mg

Djelovanje

Megestrol acetat posjeduje farmakološka svojstva slična svojstvima prirodnog progesterona. Inhibira oslobođanje FSH i LH iz adenohipofize. Na taj način potiskuje sazrijevanje folikula u jajnicima, odnosno ovulaciju, pojavu estrusa i oplodnju. Megestrol ima blago, ali značajno glukokortikoidno djelovanje i vrlo blago mineralokortikoidno djelovanje. Nema androgena niti estrogena svojstva. Poznato djelovanje megestrol acetata jest dobivanje na tjelesnoj masi zbog povećanja apetita, a ne zbog zadržavanja tekućine

Indikacije

Za blokiranje (prekid) i odgodu estrusa kod pasa i mačaka, smirenje pasa i mačaka u tjeranju, kao i vezano za promjene u ponašanju (satirizam). Kod mačaka se preporučuje za uspješno liječenje milijarnog dermatitisa i eozinofilnog granuloma.

Kontraindikacije

Ne koristiti kod pasa i mačaka koji nisu postigli spolnu zrelost, ne koristiti kod gravidnih kuja i mačaka, u slučaju lažne-trudnoće, kod kuja i mačaka sa ginekološkim poremećajima na hormonalnoj bazi i u slučaju ginekoloških infekcija.

Ne koristiti kod muških pasa namijenjnih za parenje.

Neželjene reakcije

Ponekad je primjećeno nastajanje povraćanja, anoreksija, apatijsa, pojava laktacije, učestaliji slučajevi endometritisa i piometre, cistična hiperplazija endometrijuma, izazivanje ili pogoršanje dijabetesa melitus, fibrocistična degeneracija i tumor mlječne žljezde.

U slučaju prekida liječenja sa preporučenim dozama, primjećena je nepravilnosti u seksualnom ciklusu.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br.15/98 i 70/08).

Ciljane vrste životinja

Psi i mačke

Doziranje za svaku vrstu, način i metoda primjene

Primjenjuje se samo oralno.

Psi:

Za prekid estrusa - 1 - 2 mg po kg/tjelesnoj težini. (prosječno 1,5 mg po kg/tjelesnoj težini) 3 dana, počevši od pojave prvih znakova disperzije (iscjedak iz vulve, pojava flokula krvi u estrusnom sekretu) i 0,5 - 1 mg po kg/t.m. u narednih 7 dana (1 - 2 tabletete u prva 3 dana i 1/2 - 1 tableteta u narednih 7 dana).

Za kašnjenje (privremeno odlaganje) estrusa (tokom transporta, učešća na izložbama i takmičenjima i sl.) - 0,5 mg po kg/tjelesnoj težini. dnevno, s tim da tretman počinje 7 dana prije očekivanog gonjenja i nastavlja se sve dok je potrebno odlaganje estrusa (minimalno 14 dana), a ako je potrebno nastaviti djelovanje, nakon pauze od 10 dana, postupak se može ponovljeno. Ovo se može uraditi samo jednom u 6 mjeseci.

Kod seksualno uzbuđenih muških pasa (satirijaza) sa ili bez agresije ili drugih promjena u ponašanju, primjenjuju se iste doze kao za prekid estrusa kod ženskih pasa.

Mačke:

Za prekid estrusa - 5 mg po mački (1/2 tablete) 8 uzastopnih dana, počevši od prvih znakova estrusa.

Za odlaganje estrusa - 2,5 mg po mački (1/4 tablete) 3 puta sedmično tokom perioda estrusa.

U slučaju satirijaze kod mačaka - 2 mg po kg/tjelesnoj težini. 30 dana (dok simptomi ne nestanu).

Savjeti za pravilnu primjenu

Ne primenjivati zajedno sa hranom tokom dana.

Karenca

Nije primjenjivo

Specijalni uslovi za čuvanje proizvoda

Držati van dosega i vida djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati na suhom mjestu.

Čuvati dalje od sunčevih zraka.

Ne koristit nakon isteka roka trajanja, naznačenog na vrhu pakovanja

Specijalna upozorenja

Korištenje tokom graviditeta i laktacije

Nije preporučen za upotrebu kod gravidnih kuja i mačaka.

Predoziranje (simptomi, hitne procedure, protuotrovi) ukoliko je neophodno

Prilikom produžene primjene u visokim dozama moguća je apatija i gojaznost liječenih pasa i mačaka, glandulocistična hiperplazija endometrija, fibrocistična degeneracija i tumori dojke, metriti i piometra. Mlade nedozrele životinje često prežive nedostatak estrusa i steriliteta. U slučaju prekida liječenja, čak i u preporučenim dozama, uočava se nepravilnost ciklusa estrusa

Interakcije sa drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcije

Nema

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom, odnosno u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03)

Način izdavanja

Izdaje se na veterinarski recept

Pakovanje

kutija od 30 tableta

Rok trajanja

3 godine

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-20/21-4196/23 J.B, od 13. novembra 2023. godine

Proizvođač

Golashpharma Ltd Bulgaria, Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Kyustendil, Bugarska.

Uvoznik za BiH

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

tel: 032/423-196; fax: 032/423-194