

PANVERMIN

**bolusi za goveda, ovce i koze
Samo za upotrebu u veterinarstvu**

PANVERMIN 300 mg
bolusi za goveda, ovce i koze
Samo za upotrebu u veterinarstvu

Sastav

1 bolus sadrži:

Aktivnu supstancu:

Albendazol 300mg

Pomoćne tvari: kukuruzni škrob 575,0 mg, lakoza monohidrat 1055,0 mg, povidon 45,0 mg, magnezijev stearat 20,0 mg, koloidalni anhidrovani silicij 5,0 mg

Djelovanje

Albendazol ima antihelmintski efekat u širokom spektru aktivnosti protiv zrelih i nezrelih stadija različitih crijevnih i plućnih nematoda, cestoda i trematoda.

Albendazol ima ovicidalnu aktivnost protiv gastrointestinalnih nematoda i *Fasciole hepaticae*

Albendazol kod osjetljivih parazita koči resorpciju i transport glukoze, a istovremeno remeti polimerizaciju mikrotubula u enterocotima i kutikuli tako što se veže za tubulin čime se prekida transport većine jedinjenja u ćeliji, smanjuje sadržaj hranjivih materijala i smanjuje nivo glikogena. Nakon dva do tri dana nastupa izgladnjelost parazita, zakazuju homeostatski mehanizmi, ireverzibilno se oštećeju kutikula, nastupa proteoliza i uginuće.

Indikacije

Za tretman i prevenciju infestacija uzrokovanih želučano-crijevnim i plućnim nematoda, trakavicama i metiljem kod velikih i malih preživara.

Goveda:

Nematode (odrasli i larveni oblici): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia type II*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Nematodirus spathiger*, *Cooperia punctata*, *Cooperia ancophora*, *Strongyloides papillosus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Dictyocaulus viviparus*, *Toxocara vitulorum*

Cestode: *Moniezia spp*

Trematode (zreli oblici): *Fasciola hepatica*

Ovce, koze:

Nematode (zreli i larveni oblici): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *Ostertagia trifurcata*, *Nematodirus spathiger*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Marshallagia marshalli*, *Cooperia spp.*, *Chabertia ovina*, *Gaigeria pachyscelis*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum columbianum*, *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylidae*

Cestode: *Moniezia spp.*

Trematode (zreli oblici): *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium dendriticum*

Kontraindikacije

Ne koristiti kod poznate hiperosjetljivosti na albendazol.

Ne koristiti tokom estrusa i prvi mjesec graviditeta. Ne koristiti kod životinja u periodu vještačkog osjemenjavanja ili prirodnog pripusta. Ne davati životnjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

Ne koristiti tokom prvog mjeseca gravidnosti.

Neželjene reakcije

Nisu poznate.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br.15/98 i 70/08).

Ciljane vrste

goveda, ovce i koze

Doziranje za svaku vrstu, način i metoda primjene

Aplicira se oralno u sljedećim dozama, zavisno od tipa parazita.

-5-6 mg/kg tjelesne mase Albendazola (1 bolus na 50 - 60 kg tjelesne mase)

-za tretman hronične fascioze 7,5 mg/kg tjelesne mase Albendazola (1 bolus na 40 kg tjelesne mase) i -dikrocelioza 15 mg/kg tjelesne mase (2 bolusa na 40kg tjelesne mase).

Savjeti za ispravnu primjenu

Da bi se dostigla visoka efektivnost neophodno je slijediti instrukcije za doziranje i upotrebu- oralna i pojedinačna doza za svaku životinju. Kao i kod drugih antihelminnika, odrediti tačnu preporučenu dozu i pravilno primjeniti proizvod uz pomoć veterinara da bi obezbijedili adekvatnu kontrolu parazita.

Karenca

Meso - 10 dana poslije zadnjeg tretmana ovim lijekom

Nije dozvoljeno koristiti kod životinja u laktaciji, čije se mlijeko koristi za ljudsku upotrebu

Specijalne mjere skladištenja

Čuvati van domaćaja i vida djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C

Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati na suhom mjestu.

Zaštiti od direktnе svjetlosti.

Ne koristiti poslije datuma isteka roka trajanja koji je otisnut na naljepnici iza oznake (EXP)

Specijalna upozorenja

Specijalna upozorenja za svaku ciljanu vrstu

Nema

Specijalna upozorenja za korištenje kod životinja

Nema

Specijalna upozorenja koja trebaju preduzeti osobe koje daju veterinarski lijek životinjama

Osobe osjetljive na Albendazol /i ili bilo koji sastojak bi trebale izbjegavati kontakt sa VMP i primjenjivati veterinarsko medicinski proizvod sa oprezom i zaštitnom opremom.

Tokom korištenja osobe koje apliciraju lijek trebaju izbjegavaju kontakt sa vodom, hranom i pušenje.

Nakon upotrebe oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Graviditet

Ne koristiti tokom prvom mjeseca graviditeta

Laktacija:

Ne koristiti kod životinja u laktaciji koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu

Plodnost

Ne koristiti kod životinja u rasplodu.

Interakcije sa drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima i druge forme interakcije

Nisu poznate

Predoziranje (simptomi, hitne procedure, protuotrovi) ukoliko je potrebno

Zbog svoje male toksičnosti kod sisara, albendazol ne uzrokuje sporedne efekte čak i kod 3-5 puta većeg doziranja.

Kod ovaca nema znakova netolerancije čak i nakon 5-10 puta većeg doziranja 37,5 mg/kg tjelesne mase.

Davanje u visokim dozama (53 mg/kg tjelesne mase) može dovesti do prolazne anoreksije.

Za prevenciju ovakvih reakcija preporuka je uskratiti vodu životinjama 5-6 sati.

Inkompatibilnost

Nije poznata

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom, odnosno u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03)

Način izdavanja:

Izdaje se na veterinarski recept

Pakovanje
kutija 30 bolusa

Rok trajanja
3 godine od datuma proizvodnje

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-20/21- 4195/23 J.B; od 13. novembra 2023. godine

Proizvođač: Golashpharma Ltd Bulgaria,Sapareva Bana, ul.Pobeda 33,obl.Konstendil, Bugarska

Uvoznik za BiH
Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel: 032/423-196; fax: 032/423-194