

Drontal Cat
tablete za mačke

Samo za upotrebu u veterinarstvu

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Drontal® Cat
pirantel embonat, prazikvantel
230mg+20mg
Film tablete za mačke
Samo za upotrebu u veterinarstvu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka tableta sadrži:
Pirantel embonat (pamoat) 230,0 mg
Prazikvantel 20,0 mg

DJELOVANJE

Drontal® Cat tableta je anthelmintik protiv okruglih crva i trakavica koji kao aktivne sastojke sadrži pirazinoizohinolinon derivat prazikvantela i tetrahidropirimidin derivat pirantela (kao embonatna so). U ovoj fiksnoj kombinaciji prazikvantel služi kao sredstvo protiv trakavice čiji spektar djelovanja pokriva sve važne vrste cestoda kod mačaka, posebno *Hydatigera (Taenia) taeniaeformis*, *Joyeuxiella spp.*, *Dipylidium caninum*, *Mesocetoides spp.* i *Echinococcus multilocularis*. Prazikvantel djeluje protiv svih stadija ovih parazita koji se javljaju u crijevima mačaka. Pirantel je komponenta specifična za okrugle crve i ima dobru efikasnost protiv svih relevantnih nematoda koje se javljaju kod mačaka, posebno *Toxocara cati (sin. mystax)*, *Toxascaris leonina* i *Ancylostoma spp.*. Prazikvantel se vrlo brzo apsorbira kroz površinu parazita i ravnomjerno se raspoređuje unutar parazita. In vitro i in vivo utvrđena su teška oštećenja integumenta parazita nastupaju vrlo brzo, što rezultira kontrakcijom i paralizom parazita. Osnova za brzo djelovanje je prije svega prazikvantelom izazvana promjena permeabilnosti membrane parazita za Ca⁺⁺, što dovodi do poremećaja metabolizma parazita. Pirantel djeluje kao holinergički agonist slično nikotinu i uzrokuje spastičnu paralizu nematoda depolarizirajućom neuromuskularnom blokadom.

INDIKACIJE

Za liječenje mješovitih infestacija valjkastim crvima i trakavicama kod mačaka uzrokovanih slijedećim vrstama:

- | | |
|----------------------------|---|
| Odrasli oblici askarida | - <i>Toxocara cati (sin. mystax)</i> mačja glista |
| Odrasli oblici ankilostoma | - <i>Ancylostoma tubaeforme</i> |
| | - <i>Ancylostoma braziliense</i> |
| Trakavice | - <i>Echinococcus multilocularis</i> |
| | - <i>Dipylidium caninum</i> |
| | - <i>Hydatigera (Taenia) taeniaeformis</i> |
| | - <i>Mesocetoides spp.</i> |
| | - <i>Joyeuxiella spp.</i> |

Liječenje Drontal Cat-om nije indicirano prije šeste sedmice života.

KONTRAINDIKACIJE

Nije namjenjeno za primjenu kod mačića mlađih od 6 sedmica starosti i kod gravidnih mačaka. Lijek se ne smije davati kod pacijenata kod kojih postoji hipersenzibilnost na aktivnu supstancu ili neki od ekscipijenasa.

NEŽELJENE REAKCIJE

Blagi i prolazni poremećaji probavnog trakta kao što su hipersalivacija i/ili povraćanje i blagi i prolazni neurološki poremećaji kao što je ataksija mogu se javiti u izuzetno rijetkim slučajevima. Prvi znak trovanja lijekom je povraćanje

Učestalost neželjenih reakcija definirana je korištenjem sljedeće konvencije:

- vrlo često (više od 1 od 10 liječenih životinja koje pokazuju nuspojavu(e))
- često (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)
- povremeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 liječenih životinja)
- rijetko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 liječenih životinja)
- vrlo rijetko (manje od 1 životinja na 10 000 liječenih životinja, uključujući izolirane izvještaje).

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

CILJNE VRSTE

Mačke

DOZIRANJA ZA SVAKU VRSTU, NAČIN(I) I METODE PRIMJENE

Doziranje

5 mg prazikvantela i 57,5 mg pirantel embonata po kg telesne mase

Ovo odgovara 1 tableti Drontal Cat na 4 kg tjelesne mase

Tjelesna masa	Tablete
≥1.0 -2.0 kg	½
>2.0 ≤4.0 kg	1
>4.0 ≤6.0 kg	1 ½
>6.0 ≤8.0 kg	2

SAVJET O PRAVILNOJ PRIMJENI

Tablete se daju direktno ili prekrivene mesom ili kobasicom. Nisu potrebne nikakve dijetetske mjere.

Tablete su podjeljene na polovine.

Nemojte vaditi tablete iz pakovanja prije upotreba. Sve djelimično iskorištene tablete treba baciti.

Nakon prvog otvaranja tablete ista se mora primijeniti u mjesec dana.

Dužina korištenja

Primjenjuje se jednokratno jedna tableta.

U okolnostima infestacije askaridima, posebno kod malih mačića, ne može se očekivati da je jednokratnom dehelmintacijom u potpunosti uklone paraziti iz domaćina, pa rizik od infekcije za ljude može i dalje postojati. Zbog toga se preporučuje ponoviti tretman s odgovarajućim proizvodom za okrugle crve u intervalima od 14 dana do 2-3 sedmice nakon odbića.

U slučaju nepravilne i učestale primjene lijeka postoji rizik od razvoja rezistencije na proizvod.

KARENCA

Nije primjenjivo

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati van vida i dohvata djece.

Nemojte koristiti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nakon isteka roka trajanja navedenog na kutiji iza oznake EXP.

Datum isteka se odnosi na posljednji dan tog mjeseca.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja ambalaže: sve djelomično iskorištene tablete treba baciti

Rok upotrebe proizvoda u originalnom pakovanju: 5 godina

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nemojte koristiti istovremeno sa piperazinskim spojevima.

Posebne mjere opreza za upotrebu kod životinja

Otpornost parazita na bilo koju klasu antihelmintika može se razviti nakon česte ponovljene upotrebe antihelmintika te klase.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Operite ruke nakon korištenja proizvoda.

Graviditet i laktacija:

Drontal Cat ne primjenjivati kod gravidnih mačaka.

Interakcija sa drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Antihelmintički efekti pirantela (spastična paraliza) i piperazina (neuromuskularna paraliza) mogu djelovati antagonistički kada se dva lijeka koriste zajedno.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti)

Simptomi predoziranja ne pojavljuju se pri primjeni doza manjih od petostruke preporučene doze. Prvi očekivani znak intoksikacije je povraćanje.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG VETERINARSKO MEDICINSKOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA NASTALIH TOKOM PRIMJENE PROIZVODA, AKO POSTOJE

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03)

PAKOVANJE

2, 8, 24 (3 x 8), 96 (12 x 8) filmom obloženih tableta u Al/HDPE blister foliji i kartonskoj kutiji

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-939/24; od 03. februara 2025. godine

NAČIN IZDAVANJA

Lijek se izdaje bez recepta.

Proizvođač odgovoran za puštanje serija u promet

KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324 D-24106, Kiel, Njemačka/Elanco A.H

Nosilac odobrenja za stavljanje u promet

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica, tel: 032/423-196