

**GALAPAN 75µg/ml**  
Injekciona solucija  
Za upotrebu u veterinarstvu

**Naziv proizvoda****GALAPAN 75µg/ml**

Injekciona solucija

R(+) kloprostenol

Za upotrebu u veterinarstvu

**Sastav**

1 ml sadrži:

Aktivnu supstancu: R(+) kloprostenol (kao R(+)-kloprostenol natrijum), 75µg

Pomoćne supstance: klorokresol (kao konzervanc), 1.0mg, ekscipiens

**Indikacije**

Krave: Indukcija luteolize koja omogućuje nastavak estrusa i ovulacije kod ženki u ciklusima kada se koristi tijekom diestrusa.

Liječenje subestrusa i materničnih poremećaji povezani s funkcionalnim ili perzistirajućim žutim tijelom (endometritis, piometra). Liječenje luteinskih cista jajnika.

Indukcija pobačaja do 150. dana gravidnosti

Izbacivanje mumificiranih fetusa.

Indukcija porođaja (unutar posljednjeg dvije sedmice gravidnosti).

Kobile: Indukcija luteolize u kobila s funkcionalnim žutim tijelom.

Krmače: Indukcija prasenja (obično unutar 24 do 36 sati) od 113. dana gravidnosti nadalje (1. dan graviditeta je posljednji dan prirodne ili umjetne oplodnje).

**Kontraindikacije:**

Ne koristiti u slučaju pojačane osjetljivosti na aktivnu supstancu ili drugi dodatak.

Ne koristiti kod životinja sa spastičnim respiratornim ili gastrointestinalnim bolestima.

Ne koristiti kod gravidnih životinja kod kojih nije namijenjena indukcija pobačaja ili porođaja.

Ne koristiti intravenski

**Neželjene reakcije**Goveda i svinje

Neodređena učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):	Upala mjesta injiciranja Infekcija mjesta injekcije <sup>1</sup> Zadržana posteljica <sup>2</sup> (samo za goveda)
--	--

<sup>1</sup>Anaerobne infekcije mogu se pojaviti nakon unošenja anaerobnih bakterija u tkivo intramuskularnom injekcijom.

<sup>2</sup>Nakon indukcije poroda.

Konji:

Neodređena učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):	Upala mjesta injiciranja Infekcija mjesta injekcije <sup>1</sup> Povećano znojenje <sup>2</sup> Proljev <sup>2</sup>
--	---

<sup>1</sup>Anaerobne infekcije mogu se pojaviti nakon unošenja anaerobnih bakterija u tkivo intramuskularnom injekcijom.

<sup>2</sup>Blago; privremeno.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

**Ciljne vrste**

Goveda (krave), svinje (reproduktivne krmače) i konji (kobile )

### **Doziranje za svaku ciljanu vrstu, put i metod administracije**

Instramuskularna primjena.

Krave: 2,0 ml (150 µg). Jednokratno

Indukcija estrusa: Dva dana nakon primjene preporučuje se pažljivo praćenje estrusa.

Kobile: 0,3-0,5 ml (22,5 - 37,5 µg). Jednokratno

Krmače: 0,7-1,0 ml (52,5 - 75 µg). Jednokratno

### **Karenca**

Krave i kobile: meso i iznutrice -1 dan, mlijeko -0 sati

Krmače: meso i iznutrice -1 dan

### **Specijalna upozorenja za čuvanje**

Držati izvan vida i dohvata djece.

Bočicu čuvajte u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Jednom otvarano pakovanje treba iskoristiti unutar 28 dana.

Čep bočice se ne smije probušiti više od 70 puta.

### **Specijalna upozorenja**

#### Specijalna upozorenja za primjenu kod životinja

Primjena Galapana nije preporučljiva kod kobilica koje boluju od ozbiljnih respiratornih i /ili gastrointestinalnih bolesti

Kako bi se smanjio rizik anaerobnih infekcija, koje bi mogle biti povezane s farmakološkim svojstvima prostaglandina, treba paziti da se izbjegne ubrizgavanje kroz kontaminirana područja kože. Prije primjene temeljito očistite i dezinficirajte mjesto aplikacije.

Izbjegavajte kontaminaciju proizvoda tijekom upotrebe. Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod ako primijetite bilo kakav vidljiv rast ili promjenu boje otopine.

Svinje: Koristite samo kada je tačan datum osjemenjavanja. Dati najranije 113 dana gestacije.

Veterinarsko medicinski proizvod primijenjen ranije može umanjiti održivost i težinu prasadi.

#### Specijalna upozorenja za osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod životinjama

S veterinarsko-medicinskim proizvodom treba pažljivo rukovati kako bi se izbjeglo slučajno samoinjiciranje i izravan kontakt s kožom ili sluznicama korisnika. Prostaglandini tipa F2 $\alpha$  mogu se apsorbirati kroz kožu i uzrokovati bronhospazam ili pobačaj. Trudnice, žene u reproduktivnoj dobi, astmatičari i osobe s drugim bolestima dišnih putova trebaju biti oprezni pri rukovanju veterinarsko-medicinskim proizvodom. Te osobe trebaju nositi rukavice tijekom primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda. Slučajno prolijevanje po koži treba odmah oprati sapunom i vodom.

U slučaju slučajnog samoinjiciranja, odmah potražite liječničku pomoć i pokažite liječniku uputu o lijeku ili etiketu. Ako se zbog slučajnog udisanja ili injekcije pojave respiratorni problemi, indiciran je brzodjelujući bronhodilatator, npr. Izoprenalol ili salbutamol inhalacijom.

### **Gravidnost i laktacija**

Ne koristiti kod gravidnih životinja kod kojih nije namijenjena indukcija pobačaja ili porođaja.

Proizvod se može koristiti tijekom laktacije.

### **Interakcije**

Ne koristiti na životinjama koje su podvrgnute liječenju nesteroidnih antiinflamatornih lijekova, jer on inhibira sintezu endogenog prostaglandina.

Aktivnost drugih oksitocinskih agenasa može se povećati nakon primjene kloprostenola.

Istodobna primjena oksitocina i kloprostenola pojačava učinke na maternicu

### **Predoziranje**

Ne postoji specifični antidot za R(+)-kloprostenol. Kod goveda i svinja nisu zabilježeni slučajevi predoziranja. Predoziranje R(+)-kloprostenolom kod konja može dovesti do prolaznog proljeva, povećanog znojenja oko vrata i blagog sniženja tjelesne temperature

**Inkompatibilnost**

U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj se veterinarski medicinski proizvod ne smije miješati sa drugim veterinarskim lijekovima.

**Specijalna upozorenja za neupotrebene veterinarske proizvode ili otpadni materijal**

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

**Način izdavanja**

Lijek ne podliježe izdavanju.

**Primjena lijeka:** Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar ("*Ad manum veterinarii*").

**Pakovanje**

Kutija sa jednom bočicom od 20ml, 50ml, kutija sa 5 bočica od 20ml  
Sva pakovanja ne moraju biti dostupna na tržištu.

Lijek nije namjenjen prodaji putem interneta ili drugog elektronskog medija.

**Broj i datum odobrenja:**

UP-I-06-2-20/21-403/26, od 29. maja 2026. godine

**Proizvođač**

Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona Španija

**Uvoznik za BiH**

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica



