

**KETINK**

**injekciona solucija  
za upotrebu u veterinarstvu**

**Naziv proizvoda****KETINK 100mg/ml**

Injekciona solucija

ketoprofen

Za upotrebu u veterinarstvu

**Sastav**

1ml sadrži: Ketoprofen, 100mg

**Indikacije**Goveda: antiinflamatorni i analgetski tretman bolesti mišićno-koštanog sistema i vimena.Svinje: antiinflamatorni i antipiretički tretman sindroma postporođajne disgalaktije -PDS-(Mastitis Metritis Agalactia) MMA sindroma i respiratornih bolesti.Konji: antiinflamatorni i analgetski tretman bolesti mišićno-koštanog sistema zglobova.

Simptomatski analgetski tretman kolika. Postoperativna bol i oticanje.

**Kontraindikacije**

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na aktivnu supstancu ili neko od pomoćnih sredstava. Ne koristiti na životinjama koje pate od gastrointestinalnih lezija, hemoragične diateze, krvne diskrazije, oštećenja jetre, srčanih ili bubrežnih funkcija.

Ne koristiti na ždrijebadi u u njihovim prvim mjesecima života. Ne koristiti druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIDs) istovremeno ili unutar 24 sata jedan od drugog.

**Neželjene reakcije**

U veoma rijetkim slučajevima se primjećuje: Privremena iritacija nakon višestrukog davanja intramuskularne injekcije .

Usljed mehanizma djelovanja koji uključuje inhibiciju sinteze prostaglandina, ketoprofen može uzrokovati iritacije želuca i crijeva ili uceracije. Višestruka administracija svinjama može rezultirati reverzibilnom inapetencijom. Alergijska reakcija.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

**Ciljane vrste:** goveda, svinje i konji**Doziranje za svaku vrstu, put i metod administracije :**Goveda: intramuskularna ili intravenozna primjena.

3mg katoprofena/kg tjelesne mase/dan (jednako je 3ml proizvoda /100 kg tjelesne mase).

Daje se jednom na dan tokom 3 dana.

Svinje: intramuskularna primjena.

3mg katoprofena/kg tjelesne mase/dan ( jednako je 3ml proizvoda /100 kg tjelesne mase)

Daje se jednokratno.

Konji: intravenozna primjena.

2.2mg katoprofena/kg tjelesne mase/dan (jednako je 1ml proizvoda/45kg tjelesne mase).

Daje se jednom dnevno tokom 3-5 dana.

U slučaju kolika, tretman ne bi trebao biti ponovljen dok se ne provede ponovni klinički pregled.

Ne aplicirati više od 5ml po jednom mjestu intramuskularnog ubrizgavanja. Gumeni čepovi ne smiju biti probušeni više od 166 puta.

**Karenca**

Meso (goveda, svinje, konji): 4 dana

Mlijeko (krave): nema

Nije namjenjeno za korištenje kod kobilica koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

**Specijalna upozorenja za čuvanje**

Držati van vida i dohvata djece.

Držati bočicu unutar kartonskog pakovanja da bi se zaštitilo od sunčeve svjetlosti .

Ne držati u frižideru niti zamrzavati.

Rok trajanja proizvoda pakovanog za prodaju: 2 godine

Jednom otvoreno, iskoristiti unutar : 28 dana

## **Specijalna upozorenja**

### **Specijalna upozorenja za korištenje na životinjama**

Korištenje kod životinja mlađih od 6 sedmica starosti ili starim životinjama može izazvati dodatni rizik. Ukoliko korištenje ne može biti izbjegnuto na životinjama se može zahtjevati smanjenje doza i opreza u menadžmentu. Izbjegavati intra-arterijsko injiciranje.

Ne prelaziti preporučene doze ili dužinu tretmana. Koristite sa oprezom kod dehidriranih životinja hipovolemičnih životinja ili sa niskim krvnim pritiskom, zbog potencijalnog rizika povećanja bubrežne toksičnosti. U slučaju kolika dodatna doza može biti davana nakon temeljnog kliničkog pregleda. Dovoljna količina vode za piće mora biti obezbjeđena tokom cijelog vremena trajanja tretmana.

### **Specijalna upozorenja za osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama**

Voditi računa da se izbjegne slučajno samoinjiciranje. U slučaju slučajnog samoinjiciranja, zatražiti medicinsku pomoć i pokazati naljepnicu pakovanja ili pakovanje ljekaru. Osobe sa poznatom hiperosjetljivošću na ketoprofen ili benzil alkohol bi trebale izbjegavati kontakt sa veterinarsko medicinskim proizvodom. Izbjeći špricanje po koži i očima. Ukoliko do toga dođe isprati temeljno sa vodom. Ukoliko iritacija i dalje bude prisutna zatražiti savjet ljekara.

Oprati ruke nakon upotrebe.

### **Graviditet**

Sigurnost ketoprofena ispitivana je kod gravidnih laboratorijskih životinja (štakora, miševa i zečeva) i u goveda te nije pokazala teratogene i fetotoksične efekte.

Lijek se može davati kravama u toku gravidnosti.

Sigurnost ketoprofena nije utvrđena tokom graviditeta kod svinja. Koristiti samo na osnovu procjene dobiti/rizika od strane odgovornog veterinara.

Sigurnost proizvoda nije utvrđena na fertilitet, gravidnost i fetalno zdravlje kod konja. Ne koristiti kod gravidnih kobila.

### **Laktacija**

Može se koristiti kod krava i svinja tokom laktacije.

### **Interakcije sa drugim proizvodima ili drugim formama interakcije**

Proizvod ne bi trebao biti administriran zajedno sa ili u roku 24 sata nakon administracije drugog (nesteroidnog protuupalnog lijeka) NSAIDs i glukokortikoida. Istovremena administracija diuretika, nefrotoksičnih lijekova i antikoagulacionih lijekova treba se izbjegavati.

Ketoprofen se izrazito veže za plazma proteine, i može ih izmjestiti ili biti zamijenjen od strane drugog lijeka koji se veže za proteine, kao što su antikoagulansi. Obzirom na činjenicu da ketoprofen može inhibirati sljepljivanje trombocite i uzrokovati slučaj gastrointestinalne ulceracije, ne bi trebao biti korišten sa drugim proizvodima koji imaju isti profil ili slične reakcije lijeka.

### **Predoziranje (simptomi, hitne procedure, antidoti)**

Nije bilo zabilježenih kliničkih znakova kada je proizvod administriran konjima u 5 puta (11mg/kg) u preporučenoj dozi tokom 15 dana, govedima u 5 puta (15mg/kg/dan) preporučenoj dozi tokom 5 dana ili svinjama u 3 puta (9 mg/kg/dan) preporučenoj dozi 3 dana.

Ketoprofen može dovesti do reakcije preosjetljivosti i osim toga može imati štetan efekt na želučanu sluznicu. Ovo može zahtjevati prestanak liječenja ketoprofenom i uvođenje simptomatske terapije.

### **Inkompatibilnosti**

U nedostatku studije o kompatibilnosti, ovaj veterinarsko medicinski proizvod ne smije biti mješan sa drugim veterinarskim proizvodom.

### **Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal**

Svaki neiskorišten veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

### **Način izdavanja**

Lijek ne podliježe izdavanju

Način izdavanja:

Lijek primjenjuje samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

### **Broj i datum odobrenja:**

**UP-I-06-2-20/21- 594/25, od 07. 07. 2025. godine**

**Pakovanje**

Pakovanje 1,6,10,12 x bočica od 100ml i 250ml

**Proizvođač**

Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona Španija

**Uvoznik za BiH** Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica