

MENBUTIL 100mg/ml

**injekciona solucija
za upotrebu u veterinarstvu**

MENBUTIL 100mg/ml
Injekciona solucija
Menbuton

Sastav:

1 ml injekcione solucije sadrži: Menbuton100.0 mg

Indikacije:

Stimulacija hepatodigestivne aktivnosti u slučaju digestivnih poremećaja i jetrene insuficijencije.

Kontraindikacije:

Ne koristiti u slučaju hipersenzitivnosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Ne koristiti kod životinja sa srčanim oboljenjima.

Ne koristiti kod životinja tokom posljednje trećine graviditeta.

Neželjene reakcije:

Ponekad nakon intravenozne primjene može doći do pojačane salivacije, suzenja, tremora, spontanog uriniranja i defekacije.

Nakon intramuskularne primjene mogu se javiti reakcije na mjestu aplikacije (edem, hemoragija, nekroza)

U veoma rijetkim slučajevima može se javiti reakcija anafilaktičnog tipa i trebala bi se tretirati simptomatski.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

Ciljne vrste:

Goveda, svinje, konji, ovce i koze.

Doziranje za svaku vrstu, put i metod administracije:

Telad (do 6 mjeseci) , ovce, koze i svinje:

Duboka intramuskularna ili spora intravenozna primjena.

10 mg menbutona na kg tjelesne mase, (što je jednako 1 ml injekcione solucije na 10 kg tjelesne mase),

aplicirati duboko intramuskularno ili sporo intravenozno.

Goveda:

Spora intravenozna primjena.

5-7.5 mg menbutona na kg tjelesne mase, (što je jednako 1 ml injekcione solucije na 15-20 kg tjelesne mase),

aplicirati intravenozno .

Konji: Spora intravenozna primjena.

2.5-5 mg menbutona na kg tjelesne mase, (što je jednako 1 ml injekcione solucije na 20-40 kg tjelesne mase),

aplicirati sporo intravenozno.

Nije preporučljivo intramuskularno ubrizgavanje više od 20 ml na jednoj strani.

U slučaju potrebe aplikacija lijeka može se ponoviti jednom nakon 24 sata.

Karenca:

Meso i iznutrice: Nula dana

Mlijeko: Nula dana

Specijalna upozorenja za čuvanje:

Držati izvan vida i dohvata djece.

Držati na temperaturi do 25°C.

Ne koristiti nakon isteka trajanja označenog na pakovanju.

Rok trajanja veterinarsko-medicinskog proizvoda pakovanog za prodaju: 2 godine

Jednom otvoreno, pakovanje treba iskoristiti unutar 28 dana.

Specijalna upozorenja:

Specijalna upozorenja za korištenje kod životinja:

Intravenozna administracija bi trebala biti spora (ne manje od 1 minute) da bi se izbjegli sporedni efekti opisani u „Neželjenim reakcijama“. Nije preporučljivo intramuskularno ubrizgavanje više od 20ml na jednoj strani.

Konjima se lijek daje isključivo sporo intravenozno.

Specijalna upozorenja za osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama:

Prilikom primjene preparata ne jesti, piti ili pušiti.

Osobe sa poznatom osjetljivošću na menbuton trebale bi izbjegavati kontakt sa veterinarsko medicinskim proizvodom.

Slučajno samoinjiciranje može dovesti do iritacije.

U slučaju samoubrizgavanja , potražite lječničku pomoć i pokažite pakovanje ili naljepnicu proizvoda.

Gravidnost i laktacija:

Ne koristiti kod životinja u zadnjoj trećini graviditeta.

Ovaj proizvod se može davati životinjama u laktaciji.

Predoziranje:

Trebalo bi se pridržavati preporučenog doziranja, budući da sigurnosni faktori menbutona nisu poznati.

Koristiti kardiovaskularne lijekove u slučaju srčanog bloka.

Inkompatibilnost:

Ne davati proizvod zajedno sa solucijama koje sadrže kalcijum, prokain penicilin ili vitamin B kompleks.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal:

Lijekove ne bi trebalo bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03)

Ove mjere trebale bi pomoći u zaštiti okoliša

Pakovanje:

Kutija sa 1 ili 12 bočica od 100ml.

Moguće je da se sva pakovanja ne komercijalizuju.

Način izdavanja:

Lijek ne podliježe izdavanju

Primjena lijeka:

Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar ("Ad manum veterinarii").

Proizvođač:

aniMedica Herstellungs GmbH , Im Südfeld 9, 48309 Senden-Bösensell, Njemačka

Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona, Španija

Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

aniMedica GmbH , Im Südfeld 9, 48309 Senden-Bösensell, Njemačka

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica

Broj i datum odobrenja:

UP-I-06-2-20/21-5171/25; od 26. februara 2026. godine