

**Nobilis Multriva RT IBm ND Gm Reo m**, injekciona emulzija za kokoši  
(za primjenu u veterinarstvu)

Proizvođač:

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija.

Sekundarno proizvodno mjesto: MERCK SHARP& DOHME Animal Health, Salamanca, Španija

Podnosilac zahtjeva: Intervet International Predstavništvo za BiH

Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

## IME LIJEKA

**Nobilis Multriva RT IBm ND Gm Reo m**  
Injekcijska emulzija, za kokoši

## KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 0,3 ml sadrži:

### Aktivne tvari:

Inaktivirani ptičji metapneumovirus (AMPV), soj BUT1 #8544  $\geq 19,0 U^1$

Inaktivirani virus zaraznog bronhitisa (IBV), soj M41 (GI-1 genotip)  $\geq 4,8 \log_2 HI^2$

Inaktivirani virus zaraznog bronhitisa (IBV), soj 4/91 (793B GI-13 genotip), QX - D388 (GI-19 genotip), Var2 (G1-23 genotip) i Q1 (GI-16 genotip)  $\geq 5,7 \log_2 HI^2$

Inaktivirani virus Newcastleske bolesti (NDV), soj Ulster  $\geq 5,9 U^1$

Inaktivirani virus ptičje zarazne bolesti burze (IBDV), soj GB02  $\geq 100,9 U^1$

Inaktivirani virus ptičje zarazne bolesti burze (IBDV), soj 89/03  $\geq 88,6 U^1$

Inaktivirani ptičji reovirus (ARV), soj ARV-1  $\geq 11,5 U^1$

Inaktivirani ptičji reovirus (ARV), soj ARV-4  $\geq 11,4 U^1$

<sup>1</sup> Kako je utvrđeno u in vitro testu jačine antigenske mase u ELISA jedinicama

<sup>2</sup> Kako je utvrđeno u in vivo testu jačine kod kokoši

### Adjuvans:

Lakotekući tečni parafin 43 mg

### Pomoćne tvari:

Polisorbat 80; Sorbitan oleat; PBS otopina

## INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Za aktivnu imunizaciju kokoši (rasplodna jata) za:

- smanjenje pada u proizvodnji jaja uzrokovanog ptičjim metapneumovirusom.
- smanjenje respiratornih znakova i pada u proizvodnji jaja uzrokovanih sojevima virusa zaraznog bronhitisa Massachusetts (GI-1 genotip), 4/91-793B (GI-13 genotip), QX - D388 (GI-19 genotip), Var2 (G1-23 genotip) i Q1 (GI-16 genotip).
- smanjenje smrtnosti i kliničkih znakova izazvanih virusom Newcastleške bolesti.
- pasivnu imunizaciju potomstva vakcinisanih pilića za:
  - smanjenje smrtnosti i kliničkih znakova bolesti izazvanih vrlo virulentnim (CS89), klasičnim (STC) i antigenskim varijantama (Varijanta E i GLS) sojeva virusa zarazne bolesti burze;
  - smanjenje viremije i kliničkih znakova bolesti izazvanih ptičjim reovirusom (genotipovi 1, 2, 3, 4 i 5).

Početak imuniteta:

- AMPV, IBV, NDV, IBDV i ARV: 4 sedmice nakon vakcinacije
- IBDV i ARV u potomstvu: 1 dan starosti

Trajanje imuniteta:

- AMPV, IBV, NDV, IBDV i ARV: 100 sedmica starosti
- IBDV i ARV u potomstvu: 3 sedmice starosti

## KONTRAINDIKACIJE

Nema.

## CILJANA VRSTA

Rasplodne pilenke prije pronosjenja (u uzgoju).

## DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Za intramuskularnu primjenu.

Primijeniti jednu dozu od 0,3 ml u područje prsa ili bedara u dobi od 8 sedmica starosti i dalje, ali najkasnije 4 sedmice prije početka nošenja jaja.

Prije upotrebe pustiti da vakcina dostigne sobnu temperaturu.

Prije upotrebe dobro protresti.

Šprice i igle moraju biti sterilne prije upotrebe.

Slijediti standardne aseptičke postupke.

Kada su primarne vakcinacije obavljene živim ili inaktiviranim vakcinama protiv ptičjeg metapneumovirusa (npr. Nobilis Rhino CV), virusa zaraznog bronhitisa (npr. Nobilis IB 4/91, Nobilis IB Ma5), virusa Newcastleške bolesti (npr. Nobilis ND C2, Nobilis ND Clone 30, Innovax-ND-IBD), ovu vakcinu treba dati najmanje 4 sedmice nakon davanja primarne vakcine, radi održavanja imuniteta.

## UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU

Posebne mjere predostrožnosti koje treba preduzeti lice koje daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama

Za korisnika:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje ili samoubrizgavanje može dovesti do jake boli i oteknuća, naročito ako se proizvod ubrizga u zglobov ili prst, te u rijetkim slučajevima može dovesti do gubitka ugroženog prsta ako se ne pruži urgentna medicinska pomoć. Ako vam se slučajno ubrizga ovaj veterinarsko-medicinski proizvod, odmah tražite medicinsku pomoć čak i ako je ubrizgana vrlo mala količina, i ponesite

sa sobom uputstvo iz pakovanja. Ako bol ne prolazi više od 12 sati nakon zdravstvenog pregleda, ponovo tražite medicinsku pomoć.

Za doktora:

Ovaj veterinarsko–medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i ako se ubrizga mala količina, slučajno ubrizgavanje ovog proizvoda može uzrokovati intenzivno oteknuće, koje može dovesti, na primjer, do ishemične nekroze, pa čak i gubitka prsta. Potrebna je stručna, URGENTNA, hirurška pomoć i može biti potrebno rano zasijecanje i ispiranje mjesta ubrizgavanja, naročito tamo gdje je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

## INTERAKCIJE; ISTOVREMENA PRIMJENA

Druga cjevica se ne bi trebala upotrebljavati 14 dana nakon primjene ovog cjevica.

## NEŽELJENA DJELOVANJA

Kokoši:

Rijetke (1 do 100 životinja / 1000 liječenih životinja):	Kvržica na mjestu ubrizgavanja <sup>1</sup>
--	---

<sup>1</sup> Obično se povlači u roku od 2 sedmice.

Važno je da se neželjene pojave prijavljuju. Time se omogućava stalno praćenje sigurnosti veterinarsko–medicinskog proizvoda. Prijave neželjenih pojava je potrebno slati veterinaru nosiocu dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili nadležnom organu.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene u ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

## KARENCA

Nula dana.

## POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati u hladnjaku (2° C – 8° C). Ne zamrzavati. Štititi od direktne sunčeve svjetlosti.

## POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA

Ostaci vakcine i pakovanja uništavaju se u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH, broj 33/03).

## BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP–I–06–2–20/21–2405/25, od 11. 11. 2025. godine

## PAKOVANJE

Bočica od polietilen tereftalata (PET) zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Veličina pakovanja:

Kartonska kutija sa 1 bocom od 300 ml (1000 doza) ili 600 ml (2000 doza).

Na tržištu se ne moraju pojaviti sve veličine pakovanja.

## NAČIN IZDAVANJA

Lijek ne podliježe izdavanju.

## NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („*Ad manum veterinarii*”).

**ROK UPOTREBE**

Rok trajanja veterinarsko–medicinskog proizvoda upakovanog za prodaju: 2 godine.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja direktnog pakovanja: 10 sati.

**ATC vet kod**

QI01AA18

**NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija.

Sekundarno proizvodno mjesto: Merck Sharp % Dohme Animal Health, Salamanca, Španija

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanjka 24 A, Sarajevo.