

**Nobilis Salenvac ETC**, injekciona suspenzija, za kokoši  
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač:

Intervet International B.V.; Wim de Körverstraat, 5831 AN Boxmeer;  
Holandija  
MSD A.H. UK Limited, Velika Britanija  
MSD A.H. DANUBE BIOTECH GmbH, Austrija

Podnosilac  
zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH  
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

**IME LIJEKA**

Nobilis Salenvac ETC

**KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

Svaka doza od 0,5 ml sadrži:

**Aktivna tvar:**

Inaktivirana *Salmonella enteritidis*, soj PT 4  
Inaktivirana *Salmonella typhimurium*, soj DTI 04  
Inaktivirana *Salmonella infantis*, soj A, S03499-06

**Adjuvans:**

Aluminijum hidroksid

**Pomoćne tvari:**

Tiomersal

**INDIKACIJE**

Za aktivnu, dvokratnu imunizaciju kokoši radi smanjenja kolonizacije i fekalnog izlučivanja bakterija *Salmonella enteritidis* (serogrupa D), *S. Typhimurium* i *S. Heidelberg* (serogrupa B), *S. Infantis*, *S. Hadar* i *S. Virchow* (serogrupa C).

Početak imuniteta: 4 sedmice nakon druge primjene.

Trajanje imuniteta: 90 sedmica nakon druge primjene.

**KONTRAINDIKACIJE**

Vakcina se ne smije primjenjivati kod nesilica 3 sedmice prije pronošenja i kod nosilja u fazi nesenja.

**NEŽELJENA DEJSTVA**

Vakcinacija vrlo često može dovesti do pojave malih (do 8 mm) i prolaznih opipljivih čvorića na mjestu ubrizgavanja. Čvorići se u potpunosti povlače u roku od 2 sedmice nakon druge vakcinacije.

***Upotreba tokom gravidnosti i laktacije***

Ne davati nosilicama koje se nalaze 3 sedmice prije početka nošenja.

O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu, potrebno je odmah obavijestiti nadležnog veterinaru u skladu s članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Sl. Novine FBiH" br. 15/98 i 70/08).

**CILJNE VRSTE**

Kokoši.

**DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE**

Prije upotrebe dobro protresti. Šprice i igle moraju biti sterilne prije upotrebe. Slijediti standardne aseptičke postupke.

Intramuskulamo ubrizgavanje jedne doze od 0,5 ml u dobi od 6 sedmica starosti, nakon čega slijedi druga vakcinacija jednom dozom od 0,5 ml najmanje 4 sedmice

kasnije. Drugu vakcinaciju treba provesti najkasnije do 3 sedmice prije početka nošenja.

Higijenske mjere i dobra uzgojna praksa takođe trebaju biti važan dio programa suzbijanja bolesti kako bi se smanjila učestalost infekcije Salmonell spp..

## **KARENCA**

Meso i organi: „0“ dana.

Jaja: **Ne smije** se primjenjivati kod nesilica 3 sedmice prije pronošnja i tokom nesenja.

## **POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Čuvati u hladnjaku. Čuvati van dohvata i pogleda djece.

Ne zamrzavati. Zaštititi od svjetla. Samo za veterinarsku upotrebu.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja bocice: 10 sati.

## **POSEBNA UPOZORENJA**

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Ako dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah tražiti pomoć ljekara i pokazati letak iz pakovanja ili naljepnicu.

Ne davati nosilicama.

Nisu dostupne nikakve informacije o sigurnosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima. Stoga odluku o korištenju ove vakcine prije ili nakon nekog drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donijeti pojedinačno, od slučaja do slučaja.

Ne miješati sa drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

## **Posebne mjere predostrožnosti koje treba preduzeti lice koje daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama**

Ako dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah tražiti pomoć ljekara i ljekaru pokazati letak iz pakovanja ili naljepnicu.

## **POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

## **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-20/21-4184/25, od 14. oktobra 2025. godine.

## **OSTALI PODACI**

**Pakovanje:** Kutija sa 1x1000 doza vakcine (500 ml).

**Rok upotrebe:**

Rok trajanja veterinarsko-medicinskog proizvoda upakovanog za prodaju: 3 godine.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja bočice: 10 sati.

**Način izdavanja:** Lijek ne podliježe izdavanju

**Način primjene:** Primjenu lijeka može vršiti samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („*Ad manum veterinarii*“).

**ATCvet kod:** QI01AB01

**NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International B.V.; Wim de Körverstraat, 5831 AN Boxmeer; Holandija  
MSD A.H. UK Limited, Velika Britanija  
MSD A.H. DANUBE BIOTECH GmbH, Austrija

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina