



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje
ID broj: 4254130240000
PDV broj: 254130240000
Tel./fax: +387 31/717-168
e-mail: info@sintofarm-adriatica.com
www.sintofarm-adriatica.com

Oxtra MV 10, 92,7 mg/ml

Rastvor za injekcije za goveda, konje, svinje i ovce

za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV u 1 ml:

- Aktivna supstanca: oksitetraciklin 92,7mg (što odgovara 100 mg oksitetraciklin hidrohlorida)
- Pomoćne supstance: natrijum formaldehid sulfoksilat.

INDIKACIJE:

Kod goveda, konja, svinja i ovaca liječenje infekcija izazvanih Gram-pozitivnim (*Actinomyces spp.*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) i Gram-negativnim (*Aerobacter aerogens*, *Bordetella spp.*, *Brucella spp.*, *E.coli*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*) bakterijama, spirohetama, klamidijama, mikoplazmama, rikcijama, protozoama i leptospirama, osjetljivim na oksitetraciklin.

Posebno se koristi kod:

- Bronhopulmonalne infekcije (bronhitis, bronhopneumonija...)
- Gastrointestinalne infekcije (enteritis, gastroenteritis)
- Infekcije vimena (akutni mastitis)
- Traumatski retikulo-peritonitis, metritis, metroperitonitis, flegmoni, inficirane rane, gnojne lezije.

Proizvod koristiti na osnovu rezultata antibiograma.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na aktivnu supstancu i/ili uopće na jednu od pomoćnih supstanci. Ne koristiti u uzgajalištima u kojima je uočena otpornost na tetracikline. Ne koristiti u razdoblju graviditeta i laktacije.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Upotreba tetraciklina može rezultirati alergijskim pojavama (koje se povlače uz primjenu adrenalina, kortizona itd.), intestinalni dismikrobizam (kolike, jak proljev), lokalna netolerancija (s pojavama iritacija i histolezija) i promjena funkcija jetre (steatozu i promjene testova funkcije). Tetraciklini se talože u koštanom tkivu i u zubima tokom rasta, s mogućnošću izazivanja deformacija i krhkosti kostiju. Tetraciklini mogu izazvati fotosenzibilnost. U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa

odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Goveda, konji, svinje i ovce.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:

Intramuskularno duboko ili intravenozno.

Goveda, konji, svinje i ovce 2-8ml/100kg tjelesne mase na dan, tokom 3 uzastopna dana.

UPOZORENJE ZA ISPRAVNU PRIMJENU:

Proizvod koristiti na osnovu rezultata antibiograma.

POSEBNE MJERE I UPOZORENJA:

Ukoliko je moguće lijek treba biti korišten na bazi rezultata antibiograma, ukoliko to nije moguće terapija se mora zasnivati na lokalnim epidemiološkim informacijama (regionalnim ili onim na farmi). Upotreba proizvoda koja nije u skladu sa onim što je navedeno u uputstvu za upotrebu može dovesti do povećanja rezistentnih bakterija te umanjiti učinkovitost liječenja sa ostalim antibioticima zbog potencijalne unakrsne rezistencije.

Osobe kod kojih je uočena preosjetljivost na aktivnu supstancu i na bilo koji od dodataka moraju izbjegavati kontakt sa veterinarskim lijekom. U slučaju nenamjernog kontakta treba ruke oprati vodom. U slučaju samoinjektiranja obratiti se liječniku uz pokaz ovog uputstva.

Nakon prvog otvaranja proizvod iskoristiti u roku od 28 dana.

Ne koristiti nakon isteka roka naznačenog na pakovanju.

Obzirom da se tetraciklini talože u kostima i zubima upotreba u graviditetu uz procjenu rizik/dobrobit od strane veterinara.

INTERAKCIJA SA DRUGIM VETERINARSKIM LIJEKOVIMA:

Nije poznato.

Ne prevazilaziti preporučene doze.

Proizvod se ne smije razblaživati ili miješati sa rastvorima kalcijevih soli.

OSTALE INFORMACIJE:

OXTRA MV 10 je rastvor za injekcije na bazi oksitetraciklina. Posebna formula omogućava savršenu i brzu apsorpciju aktivne supstance smanjujući eventualne kolateralne efekte tetraciklina. Oksitetraciklin je antibiotik bakteriostatskog tipa koji djeluje inhibicijom sinteze bakterijskih proteina putem ireverzibilnog vezivanja za ribozomalnu subjedinicu 30S.

POSEBNE MJERE ZA ODLAGANJE LIJEKA I NJEGOVOG OSTATKA:

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

KARENCA:

Meso i iznutrice:

- Goveda 15 dana
- Konji 23 dana
- Svinje 8 dana
- Ovce 20 dana

Mlijeko: lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja koje se upotrebljavaju u ishrani ljudi (osobito podmlatka).

NAČIN IZDAVANJA:

Lijek ne podliježe izdavanju.

NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („*Ad manum veterinarii*“)

POSEBNE MJERE ZA ČUVANJE LIJEKA:

Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

ROK UPOTREBE:

24 mjeseca, a nakon otvaranja 28 dana.

PAKOVANJE:

Boca od 50, 100, 250 i 500 ml.

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-20/21 – 526/25; od 09. septembra 2025. godine

PROIZVOĐAČ:

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com