

PHARMAVAC COLUMBI 2
Injekciona emulzija za golubove
za upotrebu u veterinarstvu

Naziv proizvoda

PHARMAVAC COLUMBI 2 Injekciona emulzija za golubove

Sastav

Jedna doza (0.3ml) sadrži:

Aktivne supstance:

Virus Newcastleske bolesti tip 1 (soj La Sota) inaktiviran min.7 log₂ HI*

Herpes virus golubova (soj V298/70) inaktiviran min.1 log₂ VN*

* Antitijela detektovana u serumu vakcinisanih pilića metodom inhibicije hemaglutinacije

* Antitijela detektovana u serumu vakcinisanih pilića metodom neutralizacije specifičnih virusa

Adjuvans: Montanide ISA 206 uljna emulzija

Pomoćne tvari:

Kvalitativni sastav pomoćnih tvari i ostali sastojci	Kvantitativni sastav, ako je ta informacija dostupna važno za pravilnu primjenu veterinarskih lijekova
Formaldehid	
Tiomersal	

Bijela do svjetložuta emulzija

Ciljne vrste

Golubovi

Indikacije

Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju golubova protiv paramiksovirusa i infekcija herpes virusom kod golubova.

Nastupanje imuniteta: 14 dana nakon posljednje injekcije

Trajanje imuniteta: 1 godina

Kontraindikacije

Ne vakcinisati bolesne životinje ili životinje kod kojih postoji sumnja na neku bolest.

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja

Vakcinišite samo zdrave životinje.

Posebne mjere opreza pri upotrebi za ciljne vrste:

Ne primjenjuju se.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja daje lijek životinjama:

U slučaju slučajnog samoinjiciranja, odmah potražite liječničku pomoć i pokažite liječniku uputstvo o lijeku ili etiketu.

Za korisnika:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajna primjena/samoubrizgavanje može uzrokovati jaku bol i oticanje, posebno ako se primjenjuje u zglobov ili prst, a u rijetkim slučajevima može dovesti do gubitka zahvaćenog prsta ako se ne pruži hitna liječnička pomoć. U slučaju slučajnog injiciranja ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda, odmah potražite liječničku pomoć, čak i ako je primijenjena samo vrlo mala količina,

i ponesite uputstvo o lijeku sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati nakon liječničkog pregleda, ponovno potražite liječničku pomoć.

Za liječnika:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajna primjena čak i male količine ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda može uzrokovati ozbiljno oticanje, što može rezultirati ishemijskom nekrozom ili gubitkom prsta. Potrebno je brzo, stručno kirurško liječenje, a može biti potrebna i rana incizija i ispiranje zahvaćenog područja, posebno tamo gdje je zahvaćena pulpa prsta ili tetiva.

Nesilice:

Vakcina je prikladna za vakcinacije golubova u razdoblju prije nesenja. Primjena potiče proizvodnju antitijela žumanjka protiv virusnih antigena, koja štite mlade od infekcije transovarijskim prijenosom.

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija:

Nema dostupnih informacija o sigurnosti i učinkovitosti ove vakcine kada se koristi s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluka o upotrebi ove vakcine prije ili nakon bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda stoga treba biti donesena od slučaja do slučaja.

Predoziranje:

Primjena dvostruke doze ne uzrokuje nikakve nuspojave.

Ozbiljne nekompatibilnosti:

U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne smije se miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Neželjene reakcije

Nisu poznate.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

Doziranje za svaku vrstu, put i metod administracije

Potkožna ili intramuskularna primjena

Vakcinalna doza za sve uzrastne kategorije životinja iznosi 0,3 ml.

Vakcina se daje subkutano u predjelu vrata ili intramuskularno u grudnu ili bedrenu muskulaturu.

Vakcinacija mladih životinja stimulira stvaranje antitijela za virusne antigene vakcine u toku 10-14 dana nakon prve primjene.

Dopunska revakcinacija koja slijedi nakon 3-5 sedmica osigurava pouzdanu zaštitu vakcinisanim životinjama protiv infekcija uzrokovanim paramiksovirusom 1 i herpes virusom golubova.

Revakcinacija: jednom godišnje.

Neophodno je da se vakcinišu odrasli golubovi u ugroženom uzgoju dva puta godišnje u periodu maksimalno od 6 mjeseci.

Savjeti za ispravnu administraciju

Vakcina je prikladna za vakcinaciju golubova prije perioda nošenja. Aplikacija vakcine izaziva produkciju antitijela protiv virusnih antigena koji štite mlade životinje protiv infekcija pomoću transovarijalnog prenosa.

Protresti prije upotrebe i povremeno tokom upotrebe.

Prije upotrebe, pustite vakcinu da dostigne sobnu temperaturu.

Primjenjujte pod uobičajenim aseptičnim uvjetima, koristeći sterilne šprice i igle.

Karenca

Nema

Specijalni uslovi za čuvanje

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Držati u frižideru na temperaturi od 2-8° C.

Rok trajanja veterinarskog medicinskog proizvoda kako je zapakovan za prodaju: 2 godine

Rok trajanja nakon prvog otvaranja : unutar 8-10 sati.

Zaštititi od uticaja sunčevih zraka.

Čuvati na suhom mjestu.

Ne koristiti nakon isteka trajanja otisnitom na naljepnici pakovanja iza EXP.

Rok valjanosti odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal

Ne odlažite lijekove putem otpadnih voda ili kućnog otpada.

Prilikom zbrinjavanja neiskorištenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnog materijala, molimo slijedite sistem povrata u skladu s lokalnim propisima i nacionalnim sistemima prikupljanja koji se primjenjuju na veterinarsko-medicinski proizvod. Ove mjere imaju za cilj pomoći u zaštiti okoliša.

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03).

Način izdavanja

Lijek ne podliježe izdavanju.

Primjena lijeka

Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar ("*Ad manum veterinarii*").

Samo za upotrebu na životinjama

Pakovanje

Veličina pakovanja: 15ml (50 doza), 30ml (100 doza)

Sve vrste pakovanja ne moraju biti u prodaji.

Broj i datum odobrenja:

UP-I-06-2-20/21-5032/25, od 26. februara 2026. godine

Proizvođač

Pharmagal Bio spol. s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovačka republika

Uvoznik za BiH

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica, tel: 032/423-196