

Uputstvo za primjenu lijeka

STOMORGYL 2

STOMORGYL 10

STOMORGYL 20

Tablete za peroralnu primjenu, za pse i mačke.

KVALITATIVNO KVANTITATIVNI SASTAV:

Jedna tableta Stomorgyl 2 ružičaste boje sadržava:

Spiramicin 150 000 i.j. ; Metronidazol 25 mg

Jedna tableta Stomorgyl 10 ružičaste boje sadržava:

Spiramicin 750 000 i.j. ; Metronidazol 125 mg

Jedna tableta Stomorgyl 20 ružičaste boje sadržava:

Spiramicin 1 500 000 i.j. ; Metronidazol 250 mg

Pomoćne tvari (1 tableta Stomorgyl 2; Stomorgyl 10 i Stomorgyl 20): jezgra tablete-
aluminijev hidroksid, sorbitol, bijeli dekstrin, želatina, limunska kiselina, magnezijev
stearat i pšenični škrob; obloga tablete- metil- hidroksipropilceluloza, polioksietilenglikol
20.000, boje košenila (Cochineal A,E 120) i titanov dioksid (E 171), te pročišćena voda

OSNOVNA SVOJSTA I DJELOVANJE

Stomorgyl tablete sadrže kombinaciju antibiotika spiramicina i metronidazola, a u kombinaciji djeluju sinergistički na brojne mikrobe uzročnike upale usne šupljine. Spiramicin iskazuje bakteriostatički učinak tj. koči rast i prekomjerno umnažanje brojnih grampozitivnih aerobnih vrsta (stafilokoki, streptokoki, Bacillus spp.) i mikoplazma.

DODATNE INFORMACIJE

Infekcije usne šupljine u mesojeda najčešće uzrokuju bakterije: *Streptococcus spp*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus spp*. te neke anaerobne vrste. Prilikom bakterijskih stomatitisa također su prisutne spirohete i fuziformne bakterije. Periodontalna bolest od posebne je važnosti za pse. Na početku bolesti nastaje zubni plak kojeg kolonizuju aerobne, a potom anaerobe bakterije.

INDIKACIJE

Infekcije pasa i mačaka uzrokovane aerobnim i anaerobnim bakterijama osjetljivim na kombinaciju spiramicin-metronidazol, a posebice upale usne šupljine: stomatitis, gingivitis, periodontitis, halitosis (neugodan zadah iz usta), pyorrhea (gnojna upala zubnog periosta s progresivnom nekrozom alveole i gubitkom zuba), dentalni apscesi, sinusitis, infekcije obrazne stijenke nakon ozljed, upala ždrijela, tonzila i dr.

KONTRAIDIKACIJE

Preosjetljivost pasa i mačaka na metronidazol ili spiramicin, to jeste kombinaciju, a što je u praksi vrlo rijetko.

Ne upotrebljavati u kombinaciji sa drugim makrolidnim antibioticima.

Upotreba lijeka nije testirana na životinjama u graviditetu i laktaciji.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Stomorgyl tablete mačkama i psima daju se p.o., 1x na dan , u dozi od 75 000 i.j. spiramicina /kg(23,4 mg/kg) i 12,5 mg metronidazola /kg.

Stomorgyl 2 tablete namjenjene su liječenju mačaka i malih pasa , dok su Stomorgyl 10 i 20 prikladne za liječenje srednje velikih i velikih pasa.

Stomorgyl 2 : 1 tableta /2kg t.m., jedanput na dan , tijekom 5-10 dana .

Stomorgyl 10 : 1 tableta /10kg t.m., jedanput na dan , tijekom 5-10 dana

Stomorgyl 20 : 1 tableta /20kg t.m., jedanput na dan , tijekom 5-10 dana

NUSPOJAVE-Vrlo rijetko životinje povraćaju tijekom liječenja , prolazno oslabe , a u serumu im porastu vrijednosti jetrinih enzima.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu , veterinar mora biti informisan i postupiti u skladu sa odredbama člana 26 Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu.

Napomene , mjere opreza i interakcije

Stomorgyl tablete se ne smiju lomiti ili usitnjavati.

Sigurnost za životinje- Predoziranje: peroralna primjena Stomorgyl tableta u dozama 5 puta većoj od preporučenih tijekom razdoblja od 15-30 dana, nije uzrokovala klinički vidljive toksične učinke.

Interakcije – Stomorgyl tablete ne treba upotrebljavati istodobno s drugim makrolidnim antibioticima.

Graviditet i laktacija -istraživanjima na miševima, štakorima i kunićima nisu otkriveni i djelove teratogeni i embiotoksični učinci djelatnih tvari. Sigurnost primjene tableta u toku graviditeta pasa i mačaka nije eksperimentalno provjerena.

Sigurnost za osobe koje primjenju lijek: nakon davanja tablete ruke i djelove kože koje su došle u kontakt sa lijekom treba oprati vodom. U slučaju peroralnog unosa tableta treba potražiti pomoć liječnika.

Sigurnost za okoliš: Nema opasnosti ako se pripravak koristi u skladu s uputom

KARENCIJA

Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju namirnica.

Način čuvanja

Na tamnom i suhom mjestu , pri sobnoj temperaturi (do 25°C) i izvan dosega djece.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept

ROK VALJANOSTI

U izvornoj ambalaži 3 godine

PAKOVANJE

Kartonska kutija s alu-blisterom u kojem je 2x10 tableta- Stomorgyl 2

Kartonska kutija s alu-blisterom u kojem je 2x10 tableta- Stomorgyl 10

Kartonska kutija s alu-blisterom u kojem je 10 tableta- Stomorgyl 20

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja veterinarsko medicinskog proizvoda ili otpadni materijali koji nastaju iz korištenja tih proizvoda

Neiskorišteni veterinarski medicinski proizvod ili otpadni materijal nastao od tog veterinarsko medicinskog proizvoda se treba odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

Broj i datum odobrenja za stavljanje u promet u BiH

Stomorgyl 2- UP-I-06-2-20/21-1506/25; od 09.09.2025. godine

Stomorgyl 10- UP-I-06-2-20/21-1508/25.; od 09.09.2025. godine

Stomorgyl 20- UP-I-06-2-20/21-1504/25; od 09.09.2025. godine

PROIZVOĐAČ

BOEHRINGER INGELHEIM , Austrija

ZASTUPNIK

Arnika Veterina SA d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 7

Sarajevo 71000

Tel: 033 765 080

e-mail : info@arnikasa.ba

